

复习指导：苯丙砒使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/508/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_508034.htm

药理：在体内部分分解成氨苯砒而起治疗作用。每165mg约与苯丙砒25mg疗效相当。口服吸收不完全，主要采用注射。适应症：用途同氨丙砒。百考试题网站整理 [氨丙砒适应证]氨苯砒单独或与其他抑制麻风药联合用于由麻风分枝杆菌引起的各种类型麻风，和疱疹样皮炎的治疗。氨苯砒也可用于脓疱性皮肤病、类天疱疮、坏死性脓皮病、复发性多软骨炎、放线菌性足分枝菌病及聚会性痤疮的治疗。氨苯砒可与甲氧苄啶联合治疗卡肺孢子虫肺炎；与乙嘧啶联合用于预防氯喹耐药性疟疾；亦可与乙胺嘧啶和氯喹三者联合用于预防间日疟。用法用量：口服，一日300mg，逐渐增量至一日3g，连服10周，停药2周。肌注，每周2次，第1-2周，每次100-200mg，以后每2周递增100mg，到14-16周每次量为800mg.继续维持，每用药10周停2周。[制剂]注射液：每支2g（5ml）；4g（10ml）。片剂：每片0.5g 禁用慎用：严重肝肾及造血系统疾病禁用。给药说明：口服期间应保持大便通畅，以免蓄积中毒。其他参见氨苯砒。不良反应：可引起胃肠道反应：恶心，呕吐，食欲不振，腹胀，腹泻。白细胞和粒细胞减少，溶血性贫血，头痛，失眠，周围神经炎，中毒性精神病。剥脱性皮炎，中毒性肝炎。个别病例有再生障碍性贫血，死亡。"#F8F8F8"

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com