

复习指导：阿替普酶使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/508/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_508063.htm

药理：属机体抗凝血因子，能结合到血纤维蛋白上，激活纤维蛋白酶原，使其转化成血纤维蛋白酶，继而溶解血纤维蛋白，使血栓得以溶解。进入体内45分钟就可溶解大部分血栓。半衰期仅5分钟，用药10分钟后，80%的原药就从体内清除。适应症：急性心肌梗塞 用法用量：（1）静滴：于第1小时内静注0.75mg/kg，后3小时按0.5mg/kg滴注。（2）静滴：第1小时滴注90mg（或1mg/kg），余量于5小时内滴完，总量可达150mg。禁用慎用：出血危象、休克史、出血性疾病、急性内出血、外科手术及外伤患者慎用，重症高血压患者慎用。给药说明：（1）用药前、中、后均应进行凝血机制检查，以防出血突然出现。（2）在急性心梗发作后3小时以内开始用药效果最好。百考试题网站整理（3）随着溶解冠脉内血栓的作用，还可改善左心室的泵血功能。不良反应：轻微的易控制的出血，偶有内出血或颅内出血。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com