

临床执业医师辅导：紫霉素使用方法执业医师资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/508/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_508427.htm 药理：作用近似卷曲霉素并与之有交叉耐药性。卷曲霉素药效学：本品为多肽复合物，毒性与氨基苷类相似，对结核杆菌有抑制作用，机理尚不明。适应症：作用近似卷曲霉素并与之有交叉耐药性。适用于异烟肼、链霉素无效的结核病。用法用量：肌注，一次1-2g，一周2次。注射剂（硫酸盐）：1g 百考试题网站整理 禁用慎用：肌注，一次1-2g，一周2次。注射剂（硫酸盐）：1g 给药说明：参见卷曲霉素。不良反应：能引起过敏反应：皮疹，药热，面部潮红或苍白，气喘，心悸，胸闷，腹痛，过敏性休克。可引起肾及听力损害。临床为出现蛋白尿、血尿、肌酐及尿素氮增多。损害前庭及耳蜗神经。也可致钙、钾及氯化物的丧失。静脉注射或腹腔内给药后可引起呼吸暂停等严重反应。相互作用：禁与链霉素同用。

"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com