

临床执业医师辅导：威乐星使用方法执业医师资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022_E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_510116.htm

理化特性：本品的化学名为1-^{-D}呋喃核糖甙-1, 2, 4-三氮唑-3-羟酰胺，分子式为D8H12N4O5，分子量为244.11，本品为无色或微黄色液体，味甜。药理作用：药效学 本药系抗病毒药，对多种病毒有抑制作用。如RNA病毒的流感病毒和DNA病毒的疱疹病毒。药动学 本药口服后很快被吸收，在60-90分钟内血药浓度达到高峰，进入体内经磷酸化后生成活性的代谢产物-利巴韦林单磷酸，清除半衰期约24hr，本药能滞留于红细胞中，主要由肾脏排泄，仅有少量从粪便排出。适应症：病毒性上呼吸道感染，皮肤疱疹病毒感染。用法用量：成人病毒性上呼吸道感染150mg/次，3次/日。连用7日。皮肤疱疹病毒感染300mg/次，3-4次/日，连用7日。注意事项：肝功能异常者慎用。『禁忌』孕妇、哺乳期妇女。百考试题网站整理 不良反应：可见食欲减退、胃部不适、呕吐、轻度腹泻或便秘等胃肠道反应，偶有头晕、睡眠欠佳，并可导致红、白细胞及血红蛋白的下降。长期或大剂量服有对肝功能有不良影响。储藏：避光，密封，在干燥处保存。有效期2年。剂型规格：口服液 150mg/5mL × 10瓶 "#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com