

扶他林乳胶剂使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E6_89_B6_E4_BB_96_E6_9E_97_E4_c22_510159.htm

理化特性：『成分』双氯芬酸二乙胺diclofenacdiethylamine 『性状』每100g扶他林乳胶剂含1.16g活性物质O-[(2,6-二氯苯)-氨基]-苯乙酸二乙胺盐(=双氯芬酸二乙胺盐)，相当于1g双氯芬酸钠。其基质是分散在水性凝胶里的脂肪乳剂，内含异丙醇和丙二醇。为一种白色、奶油状而又不油腻的制剂。『类别』外用止痛药和消炎药(TopicalAnalgesics&Anti-inflammatories) 药理作用：扶他林乳胶剂是一种外用消炎镇痛药，其活性物质含量相当于1%的双氯芬酸钠，通过揉擦很容易进入皮肤，并由于其含醇-水基质起到抚慰和清凉作用。动物实验研究表明，局部应用可使其活性成份穿透皮肤，聚集于皮下组织，抗御急慢性炎性反应。对因外伤或风湿病引起的炎症，本药的消炎镇痛特性可使炎性肿胀显著减轻，对触痛和活动性疼痛同样有效。适应症：用于下列疾病的局部治疗：肌腱、韧带、肌肉和关节的创伤性炎症，例如：扭伤、劳损和挫伤。局限性软组织风湿病，例如：腱鞘炎、肩-手综合征和滑囊炎。局限性风湿性疾病，例如：四肢与脊柱的骨关节病，关节周围病变。用法用量：按需要治疗的痛处大小，施用2-4g，并轻轻揉擦，每日3-4次。注意事项：本药只适用于无破损的皮肤表面，忌用于皮肤损伤或开放性创口处。禁止接触眼和粘膜，严禁口服。『禁忌』对双氯芬酸、乙酰水杨酸和其它非甾体抗炎药及异丙醇或丙二醇过敏者。不良反应：偶可发生皮肤瘙痒、发红、刺痛、皮疹。个别病例可见光过敏反应

，若大面积长期应用，不能完全排除引起全身副作用的可能性。过量处理：如应用不当或误服（如儿童）而引起明显的全身性副作用时，通常可采用治疗非甾体抗炎药中毒的治疗措施。储藏：隔热存放。剂型规格：乳胶剂：20g/支"100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com