

复习指导：丙环定使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_510260.htm

适应症：具有中枢抗胆碱作用，能直接拮抗平滑肌痉挛。用于治疗帕金森病，也用于药物引起的锥体外系反应，从疗效说，对强直比震颤好。口服作用可持续4小时。用法用量：口服成人常用量：帕金森病，一次2.5mg，一日3次，餐后服，必要时睡前加5mg.用量视病人的耐受情况一般可调整至每日15-30mg，分3-4次服。药物引起的锥体外系反应，开始一次2.5mg，一日3次，以后视需要及耐受情况可每日增加2.5mg，老年病人用量酌减。百考试题网站整理 [制剂与规格]盐酸丙环定片5mg（1）治震颤麻痹，开始一次2.5mg，每日3次，饭后服。然后每次5mg，每日3次，需要时睡前加5mg，日总量20-30mg。（2）药物引起的锥体外系反应，口服开始每次2.5mg，每日2次，如需要每日增加2.5mg。老年人对该药敏感，注意控制剂量。可产生药物依赖性。禁用慎用：青光眼，心动过速，尿潴留病人禁用。给药说明：可产生药物依赖性。不良反应：口干，头晕，便秘，尿潴留，瞳孔散大，视物模糊，易诱发青光眼。严重过量有中毒性精神病，幻听，幻视，可产生药物依赖性。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com