

复习指导：卡孕栓使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_510263.htm

适应症：防治宫缩弛缓所引起的产后出血。终止妊娠药，本药不宜单独使用，须与米非司酮等序贯用。应用于终止早期妊娠，特别适合高危妊娠者，如多次人流史、子宫畸型、剖腹产后以及哺乳期妊娠者。用法用量：防治产后出血胎儿娩出后，立即将本药1枚（1mg）放入阴道，贴附于阴道前壁下1/3处，约2分钟。终止妊娠停经小于等于49天之早孕妇女空腹或进食2hr后，首剂口服200mg米非司酮片后禁食2hr，第三日晨，于阴道后穹隆放置本药1枚。或首剂口服50mg米非司酮片，当晚再服25mg，以后每隔12hr服25mg.第3日晨服25mg米非司酮片后1hr于阴道后穹隆放置本药1枚。注意事项：本药不能用作足月妊娠引产。糖尿病、高血压及严重心、肝、肾功能不全者慎用。『禁忌』哮喘、严重的过敏体质、心血管疾病、青光眼患者。前置胎盘及宫外孕、急性盆腔感染、胃溃疡患者。不良反应：少数人有一过性面部潮红，胃肠道及心血管系症状。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com