

桂利嗪胶囊使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/510/2021\\_2022\\_\\_E6\\_A1\\_82\\_E5\\_88\\_A9\\_E5\\_97\\_AA\\_E8\\_c22\\_510280.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E6_A1_82_E5_88_A9_E5_97_AA_E8_c22_510280.htm)

理化特性：本品为胶囊剂 药理作用：本品为哌嗪类钙通道拮抗剂，可阻止血管壁平滑肌细胞的病理性钙内流，缓解血管痉挛。有扩张脑血管和周围血管的作用，能改善脑循环及冠脉循环，尤其对脑血管作用明显。本品还能抑制磷酸二酯酶，阻止cAMP分解成无活性的5'-AMP，从而增加细胞内的cAMP浓度，抑制组胺、5-羟色胺，缓激肽等多种生物活性物质的释放，对补体C4的活化也有抑制作用。 人致死剂量为100~500mg/kg，LD50（小鼠和大鼠口服）大于1g/kg。 『药代动力学』本品口服经3~7小时血药浓度达峰。 适应症：用于脑血栓形成、脑栓塞、脑动脉硬化、脑出血恢复期、蛛网膜下腔出血恢复期、脑外伤后遗症、内耳眩晕症、冠状动脉硬化及由于末梢循环不良引起的疾病的治疗。近年来有关文献报道，本品可用于慢性荨麻疹，老年性皮肤瘙痒等过敏性皮肤病。 用法用量：口服，每次25~50mg，每日3次。 医学教育网搜集整理 注意事项：（1）疲惫症状逐步加重者应当减量或停药。（2）严格控制药物应用剂量，长期应用出现锥体外系症状时，应当减量或停药。（3）患有帕金森病等锥体外系疾病时，应慎用。（4）驾驶员和机械操作者慎用，以免发生意外。 『禁忌症』本药品过敏史，或有抑郁症病史的病人禁用此药。 『妊娠及哺乳期妇女用药』哺乳妇女，由于本制剂随乳汁分泌。虽然尚无致畸和对胚胎发育有影响的研究报告。但原则上孕妇和哺乳期妇女不用此药。 不良反应：常见嗜睡、疲惫、

某些患者可出现体重增加（一般为一过性）长期服用偶见抑郁和锥体外系反应，如不自主运动等，强直、少数患者有口干、肌肉疼痛及皮疹。相互作用：（1）与酒精、催眠药或镇静药合用时，加重镇静作用。（2）与苯妥英钠，卡马西平联合应用时，可以降低桂利嗪的血药浓度。储藏：遮光，密封保存 剂型规格：25mg" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)