

复习指导：凡尔灵使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/510/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_8D\\_E4\\_B9\\_A0\\_E6\\_8C\\_87\\_E5\\_c22\\_510401.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_510401.htm)

理化特性：『成分』三价纯化、裂解、灭活的流感病毒『性状』每人份0.5mL含有：在鸡胚中培养的流感病毒，用Octoxynol裂解，福尔马林灭活、纯化，含有抗原：A/莫斯科/10/99（H3N2）；A/新喀里多尼亚/20/99（H1N1）-15 μg血凝素；B/香港/330/2001-15 μg血凝素。疫苗采用世界卫生组织推荐2000/2001季节流行株。此外，尚含有非活性成分：钠盐（氯化钠、磷酸氢二钠）或钾盐（氯化钾、磷酸钾）。『类别』疫苗、抗血清和免疫制剂（Vaccines

, Antisera&Immunologicals）适应症：该疫苗用作预防流行性感冒，尤其是易发生相关并发症人群：体弱多病的儿童；65岁以上老年人；慢性心脏病或支气管-肺病患者；慢性肾功能不全；糖尿病患者；免疫缺陷患者；以及危险职业人群，如医护人员、保育员，群居人群，如敬老院、军队，或其他自愿接种者。用法用量：6-36个月儿童：共接种2次，每次0.25mL（间隔4周）。成人及36个月以上儿童：0.5mL/次，肌注或皮下注射。注意事项：由于流感呈季节性发病，建议每年接种流感疫苗，温带地区干燥季节前接种，热带地区流行高峰来临前接种。免疫功能低下者，对新霉素过敏者（疫苗生产过程中使用该物质）慎用。『禁忌』对疫苗中任何一种成分，尤其是卵蛋白过敏者。『警告』发热或急性感染期患者最好推迟接种。百考试题网站整理『用药须知』用前充分摇匀，肌注或皮下注射。包装瓶有断裂出现或液体有

颜色变化时，严禁使用。可与其他疫苗同时接种，但应接种在不同部位。不良反应：局部反应如红、肿、硬结；全身反应如发热、肌痛、乏力。上述反应无需治疗，一般1~2天会自然消失。罕见速发型过敏反应。神经系统紊乱与疫苗注射的因果关系尚未被证实。相互作用：免疫抑制剂的应用可降低疫苗接种后的免疫应答。储藏：该疫苗需贮存在2-8℃冰箱内，避光保存，严禁冰冻。剂型规格：注射疫苗：0.5mL × 1支；0.25mL × 1瓶"100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)