

复习指导：甘利欣注射液使用方法执业医师资格考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_510405.htm

理化特性：性状：本品为无色的澄明液体 药理作用：本品具有较强的抗炎，保护肝细胞膜及改善肝功能的作用。药理实验证明，小鼠口服本品能减轻因四氯化碳，硫代乙酰胺和D-氨基半乳糖引起的血清谷丙转氨酶及谷草转氨酶升高。本品还能明显减轻D-氨基半乳糖对肝脏的形态损伤和改善免疫性因子对肝脏形态的慢性损伤。适应症：适用于伴有谷丙转氨酶升高的慢性迁延性肝炎及慢性活动性肝炎。用法用量：静脉滴注本品30ml用10%葡萄糖注射液250ml稀释后缓慢滴注，一日一次。禁忌症：严重低血钾症，高血钠症，高血压，心力衰竭，肾功能衰竭的患者忌用。妊娠妇女也不宜用。新生儿，婴幼儿的剂量和不良反应尚未确定，暂不用。注意事项：1.本品未经稀释不得进行注射。2.治疗过程中，应定期测血压和血清钾，钠浓度。3.在治疗过程中如出现高血压血钠血钠滞留，低血钾等情况，应暂停给药或适当减量。储藏：密闭保存有效期：暂定二年。剂型规格：规格：10ml：50mg 包装：10ml×5支/盒，80盒/箱。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com