

复习指导：小儿肠炎病因病理执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_510759.htm

1、传染性下痢：吃了不清洁的东西，以细菌性下痢为最多，如赤痢菌、病原性大肠菌、革兰氏阴性细菌、葡萄状球菌。沙门氏菌等，此病多发生在每年5~6月间。滤过性病毒也是小儿肠炎之主因，如小儿麻痹病毒。流行性肝炎病毒以及其他原因不明之病毒，都可引起流行性下痢。每年9~10月间流行之下痢，多为滤过性病毒引起的。原虫以及阿米巴虫可引起下痢，在邻国菲律宾就发现新生儿的阿米巴病例，在我国因环境卫生进步，此种病例较少。

2、全身性感染：小儿因抵抗力弱在发生中耳炎、肺炎或肾盂炎时亦可罹患下痢。

3、饮食：消化不良、过食或者饮食浓度太浓的奶、脂肪或淀粉过高，亦可引起消化不良，发生下痢。

4、口服抗生素：有些抗生素会刺激肠管发生下痢，有些抗生素抑制正常肠管菌簇之发育性而使病原性细菌过度滋长而发生下痢。

5、胃肠过敏症：有些小儿对牛乳有过敏性而发生下痢。

百考试题网站整理

6、酵素缺乏：原发性或由于下痢续发性皆可引起酵素缺乏。

7、内分泌不正常。

8、食物中毒等：除发生下痢外尚有厉害呕吐现象。

"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com