

药理学吗茛酮药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/510/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8D\\_AF\\_E7\\_90\\_86\\_E5\\_AD\\_A6\\_E2\\_c23\\_510437.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E8_8D_AF_E7_90_86_E5_AD_A6_E2_c23_510437.htm)

俗称：吗啉吲酮，吗琳啶醇，吗琳酮，lidone，moban 药物简介【药理及应用】抗精神分裂症作用比氯丙嗪强，但因可产生某些兴奋作用，不能用于治疗兴奋、躁动的精神病人。主要用于治疗急、慢性精神分裂症。【用法】口服：开始剂量每日50～75mg，3～4日内增加到每日100mg，分2～4次服用。维持剂量为每日15～20mg.控制急性症状也可注射给药。【注意】锥体外系反应比氯丙嗪多，其它有恶心、呕吐、激动、欣快、抑郁、皮疹、肝功异常、体重增加或减轻。偶有白细胞减少或增多。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)