

中药化学：药理学氟哌啶醇药师资格考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_8C_96_E5_c23_510525.htm 俗称：氟哌丁苯，
氟哌醇，卤吡醇，serenase 药物简介 【性状】白色或类白色的
结晶性粉末；无臭，无味。能溶于水。在氯仿中溶解，在乙
醇中略溶，在乙醚中微溶，在水中几乎不溶。 【药理及应用
】作用与氯丙嗪相似，作用原理亦相同。特点为：抗焦虑症
、抗精神病作用强而久，对精神分裂症与其它精神病的躁狂
症状都有效。镇吐作用亦较强，但镇静作用弱。降温作用不
明显。口服吸收快，2~3小时血浆浓度达高峰，持续约72小
时，然后缓慢下降。肝脏分布较多。约15%由胆汁排出，其
余由肾排出。主要用于： 各种急、慢性、精神分裂症。对
吩噻嗪类治疗无效者，本品可能有效。 焦虑性神经官能症
。 呕吐及顽固性呃逆。 与哌替啶合用以增强其镇痛作用
。 【用法】（1）口服用于精神病，1日4~60mg，开始时每
次1~2mg，无效时可逐渐增加剂量。用于呕吐和焦虑1日0.5
~1.5mm.（2）肌肉注射1次5~10mg，1日2~3次。百考试题
网站整理（3）静注5mg，以25%葡萄糖液稀释后在1~2分钟
内缓慢注入，每8小时1次，如无效可将剂量加倍。如好转可
改口服。 【注意】（1）多见锥体外系反应，降低剂量可减
轻或消失。尚可引起失眠、头痛、口干及消化道症状。（2
）大剂量长期使用可引起心律失常、心肌损伤。心功能不全
者禁用。（3）有报道肌注后引起呼吸肌运动障碍，应用时
应注意。（4）可影响肝脏功能，但停药后可逐渐恢复。（5
）与麻醉药、镇痛药、催眠药合用时应减量。（6）曾有致

畸报道，孕妇忌用。（7）基底神经节病变患者禁用。
。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com