

药理学氟奋乃静药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/510/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8D\\_AF\\_E7\\_90\\_86\\_E5\\_AD\\_A6\\_E2\\_c23\\_510530.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E8_8D_AF_E7_90_86_E5_AD_A6_E2_c23_510530.htm) 俗称：氟非拉嗪

，permifil，prolixin 药物简介 【性状】常用其盐酸盐，为白色或类白色结晶性粉末；无臭，味微苦；遇光易变色。在水中易溶，在乙醇中略溶，在丙酮中微溶，在苯或乙醚中不溶。

【药理及应用】抗精神病作用比奋乃静强，且较久。镇静、降低血压作用微弱，但锥体外系反应比奋乃静更多见。适用于妄想、紧张型精神分裂症。其癸酸酯或庚酸酯针剂有长效作用，详见本节长效抗精神病药。 【用法】口服：1次1

~ 10mg，1日10~30mg.或遵医嘱。百考试题网站整理 【注意

】（1）用药后容易出现锥体外系反应，如两眼斜视或向外上方固定、肢体扭转、角弓反张、颈部强直、斜颈、静坐不能、抽搐、舌根发硬等运动障碍，用药时可考虑同时用抗震颤麻痹药（如苯海索、阿托品、东莨菪碱等），以预防或减少副作用发生。如出现锥体外系反应时，可立即注射东莨菪碱，或口服苯海索或阿托品。（2）本药用量最好从小剂量开始，逐步增加。（3）在处理恶心、呕吐、头晕、晕车等反应时，一般宜采用抗焦虑药如氯氮、安定等。尽量少用本品。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)