

药理学二钾氯氮药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/510/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8D\\_AF\\_E7\\_90\\_86\\_E5\\_AD\\_A6\\_E2\\_c23\\_510573.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E8_8D_AF_E7_90_86_E5_AD_A6_E2_c23_510573.htm) 药物别名：安定羧

酸钾盐，Tranxene 英文名称：Clorazepate、DiPotassium 说明

：片剂：11.25mg；22.5mg.胶囊剂：3.75mg；7.5mg；15mg 百

考试题网站整理 功用作用：为苯二氮类抗焦虑药，作用相似

于地西洋，但效力弱，毒副作用亦小。口服后在胃内分解出

去甲地西洋而吸收，经肝脏代谢，肾脏排出，能透过胎盘屏

障，亦可自乳汁分泌。适用于焦虑症状明显的神经官能症或

其它焦虑状态。用法用量：口服：每日15mg~30mg，分次

服，亦可晚间1次服用15mg.老年人减半 不良反应少，有嗜睡

，偶见胃肠不适、口干、视力模糊，精神错乱，但都比地西

洋轻。注意事项：（1）本品有嗜睡、轻微头痛、乏力、运

动失调，与剂量有关。老年患者更易出现以上反应。偶见低

血压、呼吸抑制、视力模糊、皮疹、尿潴留、忧郁、精神紊

乱、白细胞减少。高剂量时少数人出现兴奋不安。（2）长

期应用可致耐受与依赖性，突然停药有戒断症状出现。宜从

小剂量用起。（3）青光眼、重症肌无力等患者慎用。新生

儿、哺乳期妇女、孕妇（尤其妊娠开始3个月及分娩前3个月

）忌用，粒细胞减少、肝肾功能不良者慎用。老年人剂量减

半。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载

。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)