

药理学盐酸阿米替林药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/510/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8D\\_AF\\_E7\\_90\\_86\\_E5\\_AD\\_A6\\_E2\\_c23\\_510574.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E8_8D_AF_E7_90_86_E5_AD_A6_E2_c23_510574.htm)

药物别名：阿密替林 Amitid，Amitril 英文名称：Amitriptyline Hydrochloride 说明：片剂：10mg、25mg、50mg；缓释片：50mg；注射液：10mg. 百考试题网站整理 功用作用：抗抑郁，可使各类抑郁症患者情绪提高，对其思考缓慢，行为迟缓及食欲不振有所改善，有较强的镇静催眠作用，抑郁症，特别是内源性抑郁症。也用于遗尿症、恐惧症、强迫症等。用法用量：抑郁症：口服50mg～100mg/日，1～2次/日，每1～2日增加25～50mg至150mg/日；维持量50mg～100mg/日，一个疗程约3个月，逐渐减量停药。青少年或老年人，10mg～50mg/日，维持量减半。肌肉注射或静脉注射，10mg～30mg，4次/日，尽可能换口服。遗尿症：口服，6～10岁，10mg～20mg；11岁以上，25mg～50mg；睡前服，疗程不超过3个月。注意事项：妊娠D类。孕妇、哺乳妇女、幼儿禁用。不适用于治疗双相（躁狂抑郁症）病人，可诱发躁狂相。服用本品不宜驾车辆和操纵机器等。心血管病、糖尿病、甲亢、肝肾疾病患者及有癫痫病史的病人慎用。本品久服骤停，可能出现撤药反应如恶心呕吐、头痛眩晕、失眠多梦、甚至心律失常、出现锥体外系症状和急性精神障碍等。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)