

药理学曲唑酮药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E8_8D_AF_E7_90_86_E5_AD_A6_E2_c23_510705.htm 药物简介 【药理及应用】曲唑酮是三唑吡啶类抗抑郁药，其抗抑郁作用相似于三环类和maoi，但对心血管系统毒性小，无抗胆碱副作用，较适用于老年或伴有心血管疾病的抑郁症病人。抗抑郁作用机制是选择性地阻断5-ht的再吸收，并可有微弱的阻止去甲肾上腺素重吸收的作用，但对多巴胺、组胺和乙酰胆碱无作用，亦不抑制脑内mao的活性。本品还具有中枢镇静作用和轻微的肌肉松弛作用，但无抗痉挛和中枢兴奋作用。本品对心脏无影响，但能引起血压下降，此作用与剂量相关。口服吸收良好，2小时达高峰浓度。与食物同服，可推迟其吸收，并使其吸收量降低。吸收后较多分布于肝、肾中，经肝脏代谢，其代谢产物仍有明显的活性。本品与其代谢产物均易透过血脑屏障，但少进入胎儿体内。代谢产物最后经肾脏排出，很少以原形排出（只有1%），肾功能损伤不影响其排泄。t_{1/2}平均为4.1小时。临床可用于治疗抑郁症，顽固性抑郁症患者经其它抗抑郁药治疗无效者，用本品往往有效。还可用于治疗焦虑症，尤适用于治疗老年性抑郁症或伴发心脏疾患的病人。百考试题网站整理 【用法】口服：本品应从小剂量开始，逐渐增加剂量。一般成人开始每日用50~100mg，分次服，3~4天内，每日剂量可增加至50mg，最大剂量门诊病人可达每日400mg，住院病人可达600mg.不推荐将此药用于18岁以下儿童和少年。老年人从每次25mg开始，每日2次，经3~5天逐渐增加至50mg，每日3次，很少超过每日200mg. 【注

意】（1）副作用较少而轻微。最常见的不良反应是倦睡，偶见皮肤过敏、视力模糊、便秘、口干、高血压或低血压、心动过速、头晕、头痛、腹痛、恶心、呕吐、肌肉痛、震颤、协同动作障碍。（2）癫痫患者、肝肾功能不良者慎用。

"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com