

儿童常见的几种心理障碍教师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/514/2021_2022__E5_84_BF_E7_AB_A5_E5_B8_B8_E8_c38_514486.htm 与成人一样，儿童也会出现许多心理障碍，常见的主要有以下几类。

- 1、多动症 这类孩子的智力一般正常，但存在与实际年龄不相符合的注意力不集中、活动过多、冲动任性、自控能力差的特征，以致影响学习。
- 2、遗尿症 如果5岁以上的孩子还不能自己控制排尿、夜间经常尿湿床铺、白天有时也尿湿裤子的话，那么他可能就患有遗尿症。
- 3、抽动症 指局限于孩子身体某一部分的一组或两组肌肉出现的抽动。一般表现眨眼、挤眉、皱额、吸鼻、咂嘴、伸脖、摇头、咬唇和模仿怪相等。
- 4、学校恐怖症 某些儿童由于心理因素的作用对学校过分恐惧，在上学前和上学时，出现心慌、头痛、腹痛、呕吐、尿频等症状，有的甚至拒绝上学。
- 5、学习能力障碍 这些孩子的听、读、写、讲、算等方面的能力比同龄的儿童低，他们虽然也用工，但学习成绩不好。
- 6、考试综合症 某些孩子在考试前或考试时，极度紧张，表现为全身出汗、心悸胸闷、头晕头胀、注意力涣散，以致思维迟钝，原来熟记的内容一时无法“回忆”，导致考试失败。
- 7、神经性尿频 指每天的排尿次数明显增加，但尿量不增加，尿常规正常的一种心理疾病。排尿次数可以从正常的每天6-8次增加到20-30次，每次排尿量很少，有时仅几滴。睡着以后尿频消失，睡眼前、吃饭时、上课时尿频加重。
- 8、神经性呕吐 指一种反复的餐后呕吐，往往在明显的心理因素作用下发作，但不影响食欲和体重。这种心理疾病常常伴有癔症，患者在性格上常常

以自我为中心，暗示性强。 9、梦境 指从噩梦中惊醒，能生动回忆梦里的内容，处于极度紧张焦虑状态的一种睡眠障碍。在梦境中，孩子被妖魔鬼怪捉弄，或被坏人、野兽追赶等。多半发生在后半夜。 10、夜惊 指在睡眠中突然惊醒，瞪眼坐起，惊慌失措、表情痛苦，常伴有哭喊、气促、出汗等症状。多半发生在入睡后2小时内，醒后不能回忆。 11、夜游 指在睡眠中突然睁眼，凝视坐起，下床走动。多半发生在睡后2小时内，醒后不能回忆。 12、儿童癔症 患儿童癔症的儿童大多具有自我中心、富于幻想、易受暗示、情感不稳、易走极端的性格特点。常常在自尊心受挫，人格受辱，家庭不和，同学争吵的刺激下发病。多数表现为情感爆发，如躺地打滚、哭闹不止、四肢舞动等，少数严重的表现为癔症性失明、失聪或偏瘫。 13、儿童强迫症 指明知某种行为不必要，但又无法摆脱、反复呈现的行为（比如反复洗手、反复计数）或观念，常伴焦虑和恐惧。 F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com