

药物分析：硝苯洛尔药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/515/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_515484.htm 俗称:硝苯心定，inpea

, impeasel 药物简介 【药理】 阻断 α_1 、 α_2 受体，具有内在拟交感活性，但作用仅为普萘洛尔的1/25 【应用及用法】 用于心绞痛、心律失常、口服，150~300mg/d 【注意】 (1) 除对心脏的 α_1 受体 (α_1 受体) 有阻断作用外，对支气管及血管平滑肌的 α_2 受体 (α_2 受体) 亦有阻断作用，可引起支气管痉挛及鼻粘膜微细血管收缩，故忌用于哮喘及过敏性鼻炎病人。(2) 忌用于窦性心动过缓、重度房室传导阻滞、心源性休克、低血压症病人。充血性心力衰竭病人(继发于心动过速者除外)，须等心衰得到控制后始可用本品。不宜与抑制心脏的麻醉药(如乙醚)合用。(3) 有增加洋地黄毒性的作用，对已洋地黄化而心脏高度扩大、心率又较不平稳的病人忌用。(4) 不宜与单胺氧化酶抑制剂(如帕吉林)合用。百考试题网站整理 (5) 本品剂量的个体差异较大，宜从小到大试用，以选择适宜的剂量。长期用药时不可突然停药。(6) 副作用可见乏力、嗜睡、头晕、失眠、恶心、腹胀、皮疹、晕厥、低血压、心动过缓等，须注意。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com