

2009年考研西医综合辅导讲义同步练习097考研 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/531/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_80_83_c73_531926.htm

第18章结、直肠与肛管疾病 一、A型题：在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

468．肛管直肠环的组成不包括 A．肛管内括约肌。 B．肛管外括约肌深部 C．肛管外括约肌皮下部 D．耻骨直肠肌

469．癌变可能性最小的直肠息肉是 A．管状腺瘤 B．绒毛状腺瘤 C．化生性息肉 D．家族性肠息肉病

470．临床上对于便血患者常规作直肠指检的目的是 A．诊断内外痔 B．诊断直肠息肉 C．排除肛瘘 D．排除直肠癌

471．结肠癌已有肠系膜根部淋巴结转移属于Dukes A．A期 B．B期 C．C1期 D．C2期

472．结肠癌经血行最常转移至 A．肺 B．肝 C．骨 D．盆腔

473．结肠癌经淋巴道转移最先至 A．结肠旁淋巴结 B．肠系膜根部淋巴结 C．腹主动脉旁淋巴结 D．左锁骨上淋巴结

474．结肠癌最早出现的症状是 A．腹痛 B．排便习惯的改变 C．腹部包块 D．肠梗阻

475．左半结肠癌的临床特点一般不包括 A．肠梗阻 B．便秘 C．腹泻 D．贫血

476．左半结肠癌伴急性肠梗阻原则上应 A．作左半结肠癌根治术 B．先作横结肠造口 C．先作乙状结肠造口 D．Hartmann手术

477．关于直肠癌的叙述，下列哪项不正确? A．50%发生于直肠壶腹部 B．50%为溃疡型 C．低位直肠癌比高位直肠癌多见 D．结肠癌比直肠癌多见

478．直肠癌浸润肠壁一圈约需 A．0.5~1年 B．1~2年 C．3年 D．4年

479．直肠癌向远侧肠壁纵轴浸润扩散一般不超过肿瘤边缘 A．0.5cm B．1.0cm C．1.5cm D．2cm

480．直肠癌根治时要求远端切缘距肿块下缘

至少 A . 1cm B . 1.5cm C . 2cm D . 3cm 481 . 关于直肠癌淋巴转移的叙述 , 下列哪项错误? A . 是主要的转移途径 B . 齿状线周围的癌肿可向上、侧、下方转移 C . 向下可转移至腹股沟淋巴结 D . 上段癌转移至直肠上动脉、肠系膜上动脉、腹主动脉周围淋巴结 482 . 直肠癌手术方式选择的最主要依据是 A . 肿块的大小 B . 肿块距肛缘的距离 C . 肿块的活动度 D . 癌细胞的分化程度 483 . Miles手术的绝对适应证是 A . 肛管癌 B . 患者一般情况差 C . 肿块距肛缘lt.3Cm 484 . 前哨痔是指 A . 内痔 B . 外痔 C . 肛乳头肥大 D . 肛裂时形成的突出肛门外的袋状皮垂 485 . 下列哪种疾病一般不应作肛门指检? A . 直肠癌 B . 直肠息肉 C . 肛裂 D . 肛周脓肿 486 . 关于肛裂的叙述 , 下列哪项不正确? A . 主要病因是长期便秘 B . 常位于肛管前正中线处 C . 典型表现为疼痛、便秘、出血 D . 手术不是治疗急性肛裂的唯一方法 487 . 直肠肛管周围脓肿最常见的病因是 A . 肛周皮肤感染 B . 肛腺感染 C . 肛裂 D . 内痔 488 . 引起肛瘘最常见的病因是 A . 便秘 B . 溃疡性结肠炎 C . 肛裂 D . 直肠肛周脓肿 489 . 肛瘘诊断的关键是 A . 确定窦道位置 B . 确定外口位置 C . 确定内口数目 D . 确定内口位置 490 . 挂线疗法用于治疗 A . 内痔 B . 外痔 C . 肛裂 D . 肛瘘 491 . 混合痔是指 A . 痔与肛瘘同时存在 B . 内痔和外痔在不同的部位同时存在 C . 直肠上下静脉丛彼此吻合形成的痔 D . 环形内痔 492 . 直肠指检对下列哪种疾病的诊断价值不大? A . 直肠癌 B . 直肠肛周脓肿 C . 肛瘘 D . 痔 493 . 最易与直肠脱垂相混淆的疾病是 A . 内痔 B . 直肠息肉 C . 混合痔 D . 环状痔 494 . 关于慢性便秘的叙述 , 下列哪项不正确? A . 慢性便秘的发生率约为10% B . 表现为排便困难 , 次数减少 C . 女

性较男性多见 D . 慢传输型便秘的治疗可切除无传输力的结肠

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com