

2009年考研西医综合辅导讲义同步练习094考研 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/531/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_80_83_c73_531932.htm 第15章腹外疝、腹部损伤与急性化脓性腹膜炎 一、A型题：在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。 353. 嵌顿疝和绞窄疝的主要区别是 A. 疝内容物是否有血运障碍 B. 是否有急性肠梗阻的表现 C. 是否有腹膜刺激征 D. 是否有休克 354. 下列哪种属于滑动性疝? A. 小肠壁是疝囊壁的一部分 B. 膀胱是疝囊壁的一部分 C. 小肠憩室是疝囊壁的一部分 D. 盲肠憩室是疝囊壁的一部分 355. 逆行性嵌顿疝是指 A. 一个肠袢被嵌顿的腹外疝 B. 一个肠袢被嵌顿的腹内疝 C. 多个肠袢被嵌顿的腹外疝 D. 多个肠袢被嵌顿的腹内疝 356. 成人腹股沟斜疝的发病机制不包括 A. 腹横筋膜薄弱或缺损 B. 鞘突未闭 C. 腹横肌缺损 D. 腹内斜肌缺损 357. 腹股沟直疝精索在疝囊的 A. 前方 B. 后方 C. 前外方 D. 后外方 358. 腹部切口疝多见于 A. 腹部横切口 B. 腹部斜切口 C. 腹部纵行切口 D. 麦氏切口 359. 疝内容物已经进入阴囊，最可能的腹外疝是 A. 腹股沟斜疝 B. 腹股沟直疝 C. 股疝 D. 肠管壁疝 360. 关于腹部闭合性损伤的叙述，不正确的是 A. 实质性器官损伤主要表现为腹腔内出血 B. 空腔脏器破裂主要表现为弥漫性腹膜炎 C. 肝破裂可伴有剧烈腹痛和腹膜刺激征 D. 小肠破裂时大多数病人出现气腹征 361. 腹腔内空腔脏器破裂确诊后其治疗原则是 A. 迅速手术治疗 B. 先救治休克，待休克控制后再手术治疗 C. 先救治休克再手术，但短时间处理后仍不能控制休克，也应立即手术 D. 保守治疗24小时无

效即手术 362. 闭合性腹部损伤时，下列哪项不是腹内脏器受损的表现? A. 早期出现休克 B. 有明显腹膜刺激征 C. 腹胀明显、腹壁静脉怒张 D. 有气腹征 363. 对于腹部损伤，诊断时最重要的是 A. 确定是否有内脏损伤 B. 确定是否合并休克 C. 确定是哪类脏器损伤 D. 确定是否多发伤 364. 腹部闭合性损伤病人出现睾丸疼痛、阴囊血肿，应考虑合并 A. 肾破裂 B. 膀胱破裂 C. 十二指肠降部破裂 D. 十二指肠球部破裂 365. 腹部闭合性损伤时，判断是否合并内脏伤最简单最有价值的检查方法是 A. 腹腔穿刺 B. 腹部B超 C. 腹部x线平片 D. 腹部CT 366. 对高度怀疑腹部闭合伤腹腔少量出血的患者，诊断性腹穿阴性时，应作的有效检查是 A. 诊断性腹腔灌洗术 B. B超引导下腹穿 C. 腹部CT D. ECT 367. 关于脾破裂的叙述，下列哪项不正确? A. 85%为真性破裂 B. 裂口多见于脾下极和膈面 C. 延迟性破裂多在伤后2周 D. 小儿脾破裂在抢救生命第一的原则下尽量行保脾手术 368. 结肠破裂行肠造瘘术后至少隔多久才能二期还纳? A. 1~2周 B. 2~3周 C. 3~4周 D. 4~5周 369. 对各种刺激敏感、痛觉定位准确的是 A. 壁层腹膜 B. 脏层腹膜 C. 胃 D. 小肠 370. 继发性腹膜炎最常见的致病菌是 A. 金黄色葡萄球菌 B. 溶血性链球菌 C. 大肠杆菌 D. 厌氧拟杆菌 371. 急性弥漫性腹膜炎最主要的临床表现是 A. 腹痛 B. 恶心呕吐 C. 体温增高 D. 腹胀 372. 急性弥漫性腹膜炎病情恶化的重要标志是. A. 腹痛加重 B. 腹胀加重 C. 腹部压痛加重 D. 肠鸣音完全消失 373. 急性腹膜炎的标志性体征是 A. 腹胀 B. 腹式呼吸消失 C. 移动性浊音阳性 D. 腹部压痛、反跳痛与肌紧张 374. 腹腔内液体至少达多少毫升时，腹腔穿刺才可能阳性? A. 20ml B

. 50ml C. 100ml D. 500ml 375. 急性弥漫性腹膜炎最关键的治疗是 A. 体位引流 B. 禁食、胃肠减压 C. 抗生素治疗 D. 以上都不是 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com