

执业中药师 小儿用药四大误药师资格考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/533/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E4_B8_AD_E8_c23_533594.htm 药物与糖同吃 大多数口服药物都比较难于下咽，总有那么一点怪味，因此，人们服药后总喜欢用糖来矫其味，小儿服药更是如此。但是，你可曾知道，药同糖一起吃是会影响疗效的。中医认为“甘能壅中”，这就是说吃甜食过多会影响食欲和消化，导致腹泻腹胀，特别是湿热的病人应尽量少吃甜食。现代医学也认为，在内服龙胆酊、健胃散、龙胆大黄合剂等苦味健胃药期间，不能吃糖和甜食，因为苦味健胃药能刺激末梢神经，反射性地分泌唾液、胃液等消化液，达到帮助消化、促进食欲的目的。如果在药里放很多糖，完全掩盖了苦味，结果失去了健胃之效。此外，服药时吃糖，有时还会影响到药物的吸收。

强捏鼻子灌药 孩子生了病，就应吃药。给孩子吃药可不是一件容易事儿。因为孩子不懂事，不肯吃，害怕吃药。于是一些父母就捏着孩子的鼻子，迫使孩子张口，硬往嘴里灌，弄得孩子大哭。这种捏着鼻子硬灌的服药方法很不好，一是好不容易灌下去，又会在哭叫时吐出来，孩子受罪，大人着急；二是灌不好还会出危险甚至造成死亡事故。因为人的咽部下端有两条通道，一条通胃肠的叫食管，一条是通往肺部的叫气管。在气管上面开口处，有一块“会厌软骨”，当进食吞咽时，会厌软骨便会关闭，防止食物进入气管。如果在孩子哭闹时灌药，会导致会厌软骨运动失调，药物就易进入气管，轻则呛咳或引起支气管、肺部的炎症，重则阻塞呼吸道造成窒息死亡。因此，为了孩子的安全

，千万不可捏着孩子的鼻子灌药。打针比吃药效果好 口服药是最常用的途径，安全、方便和经济是其三大优点。常用口服药的剂型有药水、中药汤剂、药片、胶囊等。药物口服后，少数在胃部吸收，大部分在小肠吸收，吸收后通过血液循环到达全身各处，从而起到治疗疾病的目的。因此，全身各部位的大多数疾病都可用口服途径治疗。注射给药，俗称“打针”，包括皮下、皮内、肌肉和静脉注射几种方式，药物到达血液的速度以静脉注射最快，肌肉注射次之。肌肉注射有一定痛苦，同时对药物制作、注射技术操作及消毒措施要求比较高，否则易发生局部感染、坏死和损伤局部神经而发生肢体瘫痪。故可以说“打针”不如吃药安全。消化系统疾病，如肠炎和痢疾，采用口服药治疗效果好。止咳、化痰药也都以口服为主。小儿肌肉不发达，臀部小，不合作，打针时技术稍有差错即可造成不良后果。故打针应具有针对性，只有在口服药难以控制病情如重型肺炎、化脓性扁桃体炎时才应打针。给小儿打针后用手按摩 在儿科门诊的注射室里，经常看见孩子在肌肉或静脉注射后，针头刚拔出，有些家长使用手不断按摩注射部位，希望减轻孩子的疼痛。其实，这种做法对孩子有害无益。大家知道，平常手指上沾有不少肉眼看不见的病菌，用手抚摸针眼时，病菌有可能沿着尚未闭合的针眼进入皮下组织或血管，引起局部组织的感染、发炎，严重时可并发菌血症、败血症。另外，当针刺破皮肤或血管时，人体有一种物质能自动将血管破裂处的血液聚集成血块，阻止其自然出血。如果不断地用手按摩，血块便不容易凝集，这样反而会加重皮下出血，以致出现一大块瘀血，俗称“乌青块”。正确的做法是：在针头拔出后，用一个消

毒的干棉球在局部轻轻压迫三五分钟，待不再出血即可。
。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com