

小儿切忌服土霉素四环素药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/533/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E5_88_87_E5_c23_533601.htm 土霉素或四环素进入人体后，会与血液中的磷酸钙结合，沉种于生长中的骨骼和牙齿，使牙齿变黄。有些小儿牙齿染黄后，还能渐渐变浅，但不易完全消退。小儿出生后4-6个月出乳牙前、儿童在5-6岁出恒牙前使用四环素、土霉素危险很大。幼儿即使用药时间很短，也会引起乳牙变色、牙釉质发育不全，并会发生龋齿。有人以为这种黄牙齿只是影响美观。其实牙齿的发育也受到影响。此外，四环素或土霉素造成骨骼生长缓慢，给婴儿服考试，大收集整理用可引起哭闹、呕吐、昏睡等到不良反应。特别要捍注意的是，孕妇这些药后会通过胎盘渗透到胎儿体内，影响胎儿的发育。因此，孕妇以及7岁以下的儿童不宜服用土霉素或四环素。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com