

苯巴比妥中毒对小儿智力有影响药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/533/2021_2022__E8_8B_AF_E5_B7_B4_E6_AF_94_E5_c23_533603.htm 苯巴比妥是用以镇静、催眠、止惊及麻醉的药物。一次进入催眠量的5~6倍，导致急性中毒，实际吸收量超过治疗剂量的15倍即有生命危险。轻度苯巴比妥中毒的患儿表现为头晕、头痛、恶心、呕吐、言语不清、视物模糊不清、运动不协调、嗜睡、神志模糊、瞳孔缩小、呼吸正常或减慢。重度中毒患儿出现烦躁不安、谵语、幻觉、惊厥、昏迷、血压降低、呼吸浅慢不规则，甚至发生呼吸、心跳停止，并导致脑水肿和肺水肿。部分患儿还出现肝、肾损害症状，如黄疸、出血、尿毒症等。对巴比妥过敏的患儿可出现皮疹。本症病人呕吐物及胃液、血、尿、脑脊液中查到苯巴比妥有助于确诊。治疗上对于口服药物中毒者，应尽快催吐、洗胃，洗胃后给予硫酸钠导泻。灌肠引起中毒者应作洗肠处理，然后输液并利尿，促进药物排出。并保护肝脏及肾脏功能，保持呼吸道通畅，给氧，必要时气管插管，用机械通气。严重病人可做血液或腹膜透析，婴幼儿可用换血治疗。同时运用抗生素预防感染。由于严重苯巴比妥中毒者可出现惊厥，呼吸不规则甚至停止，引起脑水肿，均可引起脑细胞严重缺氧，影响小儿智力发育，故应加以预防。家长中有使用此类药物者，应将药物放到小孩不易拿到的高处，以免误服。小儿学习紧张，睡眠不好的，要耐心教育小孩，不要服用巴比妥类药物。加强药品管理，药店应严禁对儿童出售此类药物，医生用药时应严格按儿童剂量使用，不可过量。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考

试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com