

2009年考研西医综合辅导讲义同步练习112考研 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/533/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_80_83_c73_533218.htm 第33章临床试题 一、A型题：在

每小题给出的A、B、C、D四个选项中。只有一项是最符合题目要求的。(899~900题共用题干)患者，男，30岁，从二楼跌下致前胸外伤。胸壁无伤口，左前胸壁大片淤斑，压痛明显，压之凹陷，有明显捻发音。患者呼吸困难，紫绀。体检：R30次/分，血压78/30mmHg，气管向右侧移位。左肺呼吸音消失，叩诊鼓音。899. 该患者最可能的诊断是 A. 多根多处肋骨骨折 B. 闭合性气胸 C. 开放性气胸 D. 张力性气胸 900. 本例患者的最佳急救方案是 A. 固定胸壁 B. 气管切开 C. 粗针头穿刺排气 D. 胸腔闭式引流 (901~903题共用题干) 骨盆骨折患者，小便不能自解，顺利插入导尿管后无尿液流出，从导尿管注人生理盐水250ml，仍无尿液排出 901. 该患者最可能的诊断为：骨盆骨折合并 A. 前尿道断裂 B. 后尿道断裂 C. 膀胱破裂 D. 输尿管断裂 902. 为确诊本病例，应首选作的检查是 A. B超 B. x线 C. 膀胱造影 D. IVP 903. 对本例患者的正确处理是 A. 从尿道插入导尿管持续导尿 B. 耻骨上膀胱造瘘 C. 修补破口耻骨上膀胱造瘘 D. 尿道会师术 (904~905题共用题干) 男，60岁，间断无痛性血尿2月。体检：贫血貌，上腹部未触及肿块，左精索静脉明显曲张，右精索静脉无曲张。血沉45mm/h。904. 该患者最可能的诊断为 A. 右精索静脉曲张 B. 肾癌 C. 肾盂癌 D. 肾母细胞瘤 905. 为确诊该病例，应首选下列哪种检查? A. B超 B. CT C. MRI D. 静脉尿路造影 (906~907题共用题干) 患者，男38

岁，体重60kg。行毕式胃大部切除术后第6天，感左上腹疼痛，大量肠液自腹腔引流管流出。体检：体温37.9℃，左上腹轻压痛，无肌紧张。906. 该患者的首选治疗措施是 A. 急诊手术 B. 充分补液，严密观察病情变化 C. 积极肠外营养支持 D. 鼻饲肠外营养

907. 该患者每天的基本需要量为 A. 1000kCal B. 1200kCal C. 1500kCal D. 2000kCal (908 ~ 909 题共用题干) 患者，女，48岁。剧烈咳嗽后左大腿根部出现包块，逐渐变硬，疼痛难忍。一天后出现剧烈中下腹痛，间断呕吐胃内容物。查体：腹部膨隆，中下腹腹肌紧张，压痛反跳痛明显。908. 本例最可能的诊断为 A. 左下肢血栓栓塞 B. 急性盆腔炎 C. 急性腹膜炎 D. 腹股沟嵌顿疝

909. 本例最恰当的治疗是 A. 补液抗感染，注意维持水电解质平衡 B. 保守治疗，胃肠减压 C. 保守治疗4~6小时无缓解，再手术 D. 急诊手术 (910 ~ 911题共用题干) 女性患者，47岁。反复间断右上腹痛3年，加重3天入院。伴寒战高热，皮肤巩膜中度黄染。910. 该患者的首选检查方法是 A. B超 B. MRCP C. PTC D. ERCP

911. 若体检时该患者血压为80 / 50mmHg，则患者的首选治疗方案为 A. 抗炎、抗休克、维持水电解质平衡 B. 给予足量广谱抗生素 C. 行必要术前准备后，急诊手术 D. 积极纠正休克后手术治疗

男性，35岁，心慌、气促2年加重3天入院。体检：R25次 / 分，端坐呼吸，口唇发绀。双肺底闻及散在细小湿啰音，心尖部第一心音亢进和舒张中期隆隆样杂音，于胸骨左缘第3、4肋间闻及开瓣音。912. 本例最可能的诊断为 A. 二尖瓣狭窄 B. 二尖瓣关闭不全 C. 二尖瓣狭窄合并二尖瓣关闭不全 D. 二尖瓣狭窄合并肺动脉关闭不全

913. 为使该患者获得确诊，最需要作下列哪项检查 A

. 胸部X线片 B . B超 C . 二维超声心动图 D . 心导管检查 914
. 若诊断成立，待该患者病情稳定后，其治疗方案应选择 A
. 闭式二尖瓣分离术 B . 直视二尖瓣分离术 C . 二尖瓣修复
成形术 D . 二尖瓣替换术 100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com