

红药水不能和碘酒混用  
药师资格考试 PDF 转换可能丢失图片  
或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/534/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BA\\_A2\\_E8\\_8D\\_AF\\_E6\\_B0\\_B4\\_E4\\_c23\\_534648.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022__E7_BA_A2_E8_8D_AF_E6_B0_B4_E4_c23_534648.htm) 人们都知道皮肤割破或擦伤后，要涂抹一些消毒药水，这样伤口不容易感染，好得快。有的人就认为，既然都是消毒药品，都有消毒作用，那么两种药水肯定可以一起用，涂抹一点红药水，再涂抹一点碘酒，也许消毒的作用会更好。其实这是一种非常危险的用药方法。碘酒和红药水都是外科常用的消毒剂。碘酒常用浓度为2%，有强力的杀菌作用，主要用于皮肤消毒，涂后待干即可用酒精擦去。皮肤红肿、小疖疮等涂碘酒有消毒作用，注意只涂红肿部位，范围不要扩大。如有小外伤也可涂碘酒防细菌感染。碘酒有刺激性，不可涂在黏膜部位。红药水也叫红汞，浓度为2%~4%。其杀菌力弱，无刺激性，用于皮肤、黏膜及小伤口的消毒。红药水和碘酒分别使用，都具有消毒杀菌作用，但是在处理伤口时，却不能涂了其中一种，再涂另一种。这是因为红药考，试大收集整理水里的汞溴红和碘酒里的碘相遇时，会生成碘化汞。碘化汞是一种剧毒物质，对皮肤黏膜及其他组织会产生强烈的刺激作用，甚至引起皮肤损伤、黏膜溃疡。含量过高的碘化汞如果进入人体，就会导致汞中毒，还会使牙床红肿发炎，严重时会引起疲乏、头痛、体温下降等症状。所以，千万不能同时使用碘酒和红药水。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)