

执业西药师 卡马西平简介药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/535/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E8\\_A5\\_BF\\_E8\\_c23\\_535085.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/535/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_A5_BF_E8_c23_535085.htm) 「参考值」有效血药浓度范围：0.5 ~ 2.5mg/L。3 ~ 8.0mg/L时可出现副作用。8.5 ~ 10mg/L出现中毒症状。「药代动力学参数」血浆蛋白结合率：65% ~ 83%，分布容积：0.8 ~ 1.4L/kg，半衰期：35小时。「药物影响」卡马西平与苯妥英或苯巴比妥合用，其血药浓度下降。丙氧吩、异菸肼、抗菌素、红霉素等可使卡马西平的浓度增加，大剂量收集整理血药浓度增加而导致中毒。卡马西平可抑制优降糖的利尿作用。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)