

高血压伴哮喘如何选用降压药药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/537/2021_2022__E9_AB_98_E8_A1_80_E5_8E_8B_E4_c23_537424.htm

高血压合并哮喘或阻塞性肺病病人，应在医生的指导下，选用既能降低血压，又能降低肺动脉压，松弛支气管平滑肌，减轻支气管痉挛和改善通气功能等作用的降压药。钙拮抗药 钙拮抗药为治疗高血压合并哮喘的首选药。这类药物具有解除支气管平滑肌痉挛、降低肺动脉压和改善通气功能等作用。一般来说，对心跳偏慢的高血压伴哮喘病人，可选用短效的硝苯地平（心痛定），或硝苯地平控释片（拜新同）；尼群地平（洛普思）；中效的非洛地平（波依定）、尼卡地平（佩尔地平）等。对伴有肺心病，右心功能不全的高血压伴哮喘病人，可选用长效的氨氯地平（络活喜）。在服药期间，可能有心跳加快、面部潮红、踝部水肿等不良反应。对心跳偏快的高血压伴哮喘病人，可选用维拉帕米（异博定）、异博定控释片；也可选用地尔硫草（恬尔心）、地尔硫草缓释胶囊（合贝爽）。有心脏传导阻滞，心动过缓者禁用。 受体阻滞药 常用的有哌唑嗪（脉宁平）、特拉唑嗪（高特灵）和多沙唑嗪（必亚欣）等，后二者更适用于伴有高脂血症或前列腺增生病人。首剂均在临睡前服用。服药期间，尽量避免夜间起床，以防发生体位性低血压的不良反应。孕妇及哺乳期妇女及儿童禁用特拉唑嗪。 下列降压药慎用或禁用 中枢性降压药 如可乐定，服用后可有水钠潴留或有体位性低血压等不良反应，老年人慎用。 受体阻滞药 如普萘洛尔（心得安），服用后，可加重支气管平滑肌痉挛，导致哮喘发作，

应禁用。利尿药如氢氯噻嗪（双氢克尿噻）和呋塞米（速尿）等应慎用。因为这类药物会使痰液黏稠度增加，使痰液难以咳出，加重呼吸道阻塞。血管紧张素转换酶抑制剂有些高血压合并哮喘病人，在服用卡托普利（开博通）后，会引起剧烈的干咳，这对慢性阻塞性肺病病人不利，应慎用。

"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com