

药物分析 盐酸阿米替林注射液药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/537/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_537658.htm 【成份】盐酸阿米替林

适应症：适用于各种重症抑郁症、严重的抑郁状态、抑郁症的治疗初期或者口服药物有困难者。**性状：**无色或几乎无色的澄明液体。**药理毒理：**属三环类抗抑郁药，能阻断突角前膜对去甲肾上腺素及5-羟色胺的再摄取，具有较强的抗抑郁和镇静作用，还有较强的抗胆碱作用。**药代动力学：**肌肉注射后吸收快而完全，广泛分布于体内，达峰时间（ t_{max} ）不到6小时。主要与血浆和组织蛋白结合，也能通过胎盘屏障，或经乳汁分泌，半衰期（ $t_{1/2}$ ）9-25小时，血药浓度个体差异大，但与疗效无关，经体循环后主要在肝脏代谢，主要活性代谢物为去甲替林、阿米替林和去甲替林再经羟化或N-氧化代谢，大部分代谢物以结合和游离形式经肾脏排出。**用法用量：**肌肉注射：一次20~30mg，一日2次，病情严重者可酌增剂量。一旦病人能配合治疗，可改为口服给药。**不良反应：**常见注射局部疼痛、红肿、口干、便秘、视力模糊、眩晕、鼻塞、心悸、心动过速、恶心呕吐。偶见嗜睡、出汗、震颤、头痛、静坐不能、高血压、体位性低血压、一过性心电图（EGG）异常或血清谷氨酸丙酮酸氨基转移酶（SGPT）升高、排尿困难、皮疹等。**禁忌症：**严重心脏病、青光眼、前列腺肥大、尿潴留、重症肌无力、药物过敏者禁用。**注意事项：**不宜与单胺氧化酶抑制剂（MAOI）同用，有严重不良反应时应停用，治疗期应加强心电图随访检查。**孕妇及哺乳期妇女用药：**孕妇、哺乳期慎用。**儿童用药：**婴幼儿慎用。

老年患者用药：老年人慎用。 药物相互作用：尚不明确。 有效期：暂定2年。 规格：2ml 20mg 贮藏：遮光，密闭保存。
"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com