

药物分析 阿洛西林钠说明药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_538501.htm 药品名称（包括商品名、通用名） 阿洛西林钠 用法用量 缓慢静脉注射或滴注，肌注：成人，每日6~15g，分2~3次给予。儿童（重症），每日每千克体重450mg，分3次给予。 药理作用 本品为半合成广谱酰脲青霉素，口服不吸收，抗菌作用与哌拉西林相似，抗绿脓杆菌作用较强，对耐庆大霉素及羧苄西林的绿脓杆菌亦有较好作用，对克雷白菌属的作用较美洛西林（mezlocillin）弱。本品对 β 内酰胺酶及酸敏感。 适应症 临床用于治疗绿脓杆菌等敏感细菌所致下呼吸道感染、尿路感染、皮肤组织及骨关节感染和细菌性败血症等。 不良反应 （1）与青霉素相似，主要以过敏反应为多见，应用前须作本品或看霉素过敏试验，方法同青霉素，过敏者禁用。（2）本品一般耐受性良好，最常见副反应为胃肠功能紊乱和皮疹。其他不良反应同羧苄西林。（3）本品在婴儿中应用经验不足，新生儿不宜应用。（4）尽管本品抗菌谱广，但耐药菌极为常见，应用本品治疗前或考试，大收集整理期间须作药物敏感性试验，建议本品不宜单独用于经验性治疗。（5）肾功能衰退患者须及时调整给药剂量或间隔，血液透析可清除本品，故血液透析后须及时给药。 制剂 粉针剂：2g，3g，4g."#F8F8F8"

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com