药物分析 霍乱菌苗药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_538502.htm 适应症： 本品系用霍乱弧菌古典型、 El-Tor型分别培育、杀菌后，经稀释成所需浓度加氢氧化铝吸附制成。用于预防霍乱、副霍乱。 用法用量： （1）重点用于港口、铁路沿线工地工作人员，下水道、粪便、垃圾处理人员，饮食业、医务防疫人员，水上居民，旅游者考试，大收集整理及旅游服务人员，以及卫生条件较差的地区、霍乱流行的地区和流行感染威胁地区的人群。 （2）肌内注射于上臂外侧三角肌处。 （3）初次注射本菌苗者需注射 2次，间隔 48周。 注射用量如下：6周岁以下6周岁以上第1针0.3ml 第1针0.5ml 第2针0.3ml第2针0.5ml 每年于流行季节前再加强 1次，用量与第 2针同。 本品加有吸附剂，易沉淀，每次吸取前轻轻摇匀，避免菌苗浓淡不均，吸入针管后如放置时间稍长，须摇匀后再注射。 注射部位须严密消毒，注射用量、部位均应准确无误。 上臂外侧三角肌皮下注射，第一年注射2次，每次间隔7-10天，以后每年注射1次。第1次用量：6岁以下0.2ml，7-14岁0.3ml，15岁以上0.5ml.以后各次用量加倍。有疫情时，第1次注1ml隔7-10天再注1ml。 禁用慎用： 发热，严重高血压，心、肝、肾脏病及活动性结核，孕妇，月经及哺乳妇女，有过敏反应病史者均禁用。 不良反应： 注射本品一般无反应，有的接种部位有红肿、疼痛，或有低热、疲倦、头痛等，一般不需处理即行消退。如有严重反应，应及时诊治。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com