

药理学爱维治药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022__E8_8D_AF_E7_90_86_E5_AD_A6_E2_c23_539290.htm

药物简介 类别：干扰素诱导剂

【适应症】 1.用于脑血管疾病、痴呆（中风、脑外伤）。 2.用于周边血流（动，静脉）紊乱及所引起的症状（动脉血管病，腿部溃疡）。 3.用于烧伤、烫伤，糜烂。 4.用于创伤、褥疮，促进伤口愈合。

【用量用法】 静脉注射、动脉注射、肌肉注射，也可静滴。 1.剂量：按病情决定相应剂量，初期每日10～20ml静注或动注。进一步治疗量为每日5ml静注或缓慢肌注，或每周数次输注。将爱维治10～50ml，加入200～300ml溶液中（等渗盐水，5%葡萄糖或果糖溶液）滴注。

2.脑血液循环障碍和营养紊乱：初期每日10ml静注，连续2周，继后5～10ml，1周数次，连续用药4周。 3.缺血性中风：爱维治20～50ml加入200～300ml溶液中每日或1周数次滴注，连续2～3周。 4.动脉血管病：爱维治20～50ml加入溶液中每日或每周数次动注或静注，治疗周期为4周。 5.预防治疗和放疗引起的皮肤和粘膜损伤；在放疗期间，平均每日5ml静注。 6.放射性膀胱炎：每日爱维治10ml，经尿道联合抗生素治疗。

【注意事项】 1.对本品或同类物质有过敏反应的病人忌用。 2.使用本品证明对母婴无不良影响，但使用时要注意衡量对婴考，试大收集整理儿可能产生的潜在危险。 3.过敏反应如荨麻疹、皮肤潮红、药物热、休克等极为罕见。 4.本品是高渗溶液，故用于肌注时要缓慢，注射液每次不超过5ml，用于静滴必需加入等渗盐水，5%葡萄糖或果糖溶液中，本品中含有葡萄糖，糖尿病人使用时，宜谨慎。 5.本

品在与其他输液或注射液混合时，即使混合液清澈也不能排除药物相互作用可能产生的物理化学变化。鉴于上述原因，本品针剂不宜与其他针剂混合使用。6.本品注射液为淡黄色，色泽深浅取决于制备开始时所用的材料，所以，一批药物与另一批之间有少量色泽上的差异，但不影响疗效。

。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com