

服用降压药有“三忌” 药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/539/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9C\\_8D\\_E7\\_94\\_A8\\_E9\\_99\\_8D\\_E5\\_c23\\_539297.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022__E6_9C_8D_E7_94_A8_E9_99_8D_E5_c23_539297.htm)

一、忌突然停药降压药。有些降压药突然停药的话，容易发生“降压药停药综合征”，使病人血压反跳上升，甚至超过原来血压的最高水平，以致发生脑血管意外。因此，需要停药时，要采取逐渐减量的方法，以保持血压相对稳定。

二、忌降压的过程过快。一次服用降压药物过多或使用强降压药物，均可引起血压骤降、血压过低，造成病人血流缓慢，局部血黏度增高以及心、脑供血不足，使病人容易发生心绞痛、心肌梗塞或脑血栓等合并症，并可加重肾功能的损害。一般来说，对血压水平较高的重度患者或有心、脑、肾合并症的高血压病人，血压不一定要降至正常，以保持在正常人略高的水平较合适，或降到患者能够耐受、无主观不适即可。

三、忌降压药物用用停停。药物治疗应坚持不懈，切不可用用停停。有些高血压病人常常因为不能坚持用药而造成治疗失败。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)