

阿莫西林不宜作为常备药药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/539/2021\\_2022\\_\\_E9\\_98\\_BF\\_E8\\_8E\\_AB\\_E8\\_A5\\_BF\\_E6\\_c23\\_539298.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022__E9_98_BF_E8_8E_AB_E8_A5_BF_E6_c23_539298.htm)

阿莫西林胶囊是常用的抗生素药物。临床上该药发生不良反应的情况，与药品使用说明书中的介绍基本相符：临床应用的不良反应极低，偶有腹泻、恶心、呕吐等胃肠道反应及皮疹。在家庭使用阿莫西林胶囊的患者中，时有皮疹等过敏反应发生，个别人的过敏症状还比较严重，说明阿莫西林在放置过程中仍有可能发生分解与聚合等化学变化，形成新的过敏性杂质，而保存于家庭中的药物在炎热潮湿的季节里变质失效的速度会加快。保存注意事项：不少人放置药物如同对待杂物，哪里方便放哪里。如果将阿莫西林置于离炉灶、暖气等热源较近的地方，就容易发生变质。有人放在家中的阿莫西林胶囊已临近失效期了，保存条件又不好，服用后出现过敏反应并不奇怪。目前，药品的生产物流方式日益科学化，工厂生产的药品能很快到达患者的手中。仓储条件好了，仓储时间短了，更利于保证药品的质量。家中缺乏长期保存药物的条件，有可能造成有效期内的阿莫西林胶囊引起过敏反应。服用建议：有些地方曾频繁出现过阿莫西林胶囊引起严重过敏反应的现象，并有致死病例发生。这种现象引起了医药界的关注，说明严格规范阿莫西林胶囊生产、销售和使用的必要性。中国药典和国家卫生行政部门规定使用阿莫西林前须进行皮肤过敏性试验。家庭不具备进行青霉素过敏性皮试的条件，自行服用阿莫西林胶囊时，对可能出现的药物过敏反应难以防范。因此，使用阿莫西林胶囊应遵医嘱，将

其作为家庭常备药物自行服用既有盲目性，也有危险性。使用阿莫西林胶囊免皮试的做法在医疗卫生单位至今仍较普遍，在有些药店也可以直接购得该药。但药品质量因生产厂家的生产和技术条件不同而参差不齐，存在过敏反应的风险不可忽视。医院药房、药店和患者都应选择声誉好的阿莫西林胶囊产品。对青霉素过敏的患者应慎用或不用阿莫西林胶囊。经国家有关部门批准后上市的免皮试阿莫西胶囊及其他口服青霉素类药品今后会逐步得到普及，但也不宜久存于家中 and 随意使用。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)