

奥卡西平预防性治疗偏头痛无效药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/539/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A5\\_A5\\_E5\\_8D\\_A1\\_E8\\_A5\\_BF\\_E5\\_c23\\_539818.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022__E5_A5_A5_E5_8D_A1_E8_A5_BF_E5_c23_539818.htm) 美国Thomas Jefferson大学医院Silberstein等进行的最新研究表明，虽然使用奥卡西平预防性治疗偏头痛安全，患者耐受性良好，但该治疗无效。该研究为一项多中心双盲随机安慰剂对照研究，包括4周的单盲基线阶段和15周的双盲阶段，其中双盲阶段包括6周剂量调整阶段、8周维持阶段和1周撤药阶段，随后患者进入一个为期13周标签开放的扩展试验阶段。在剂量调整阶段，起始给予奥卡西平150 mg/d，然后每5天增加150 mg/d，直至最大剂量1200 mg/d。主要转归指标为双盲阶段最后28天与基线时比较纳入者偏头痛发作次数的改变。评估奥卡西平与安慰剂对比预防性治疗偏头痛的疗效、安全性和耐受性。结果共有85例患者被随机分配接受奥卡西平治疗（治疗组），其余85例接受安慰剂治疗（安慰剂组）。在双盲阶段最后28天，两组患者偏头痛发作次数的改变无显著差异（ $P = 0.2274$ ）。68例（80%）治疗组患者和55例（65%）安慰剂组患者报告发生不良事件，大部分不良事件不严重，治疗组患者最常见的不良事件为疲劳（20.0%）、头晕（17.6%）和恶心（16.5%），超过15%的安慰剂组患者未发生任何不良事件。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)