

考研复习指导之考研西医外科学辅导035考研 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/546/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E7\\_A0\\_94\\_E5\\_A4\\_8D\\_E4\\_c73\\_546224.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/546/2021_2022__E8_80_83_E7_A0_94_E5_A4_8D_E4_c73_546224.htm)

食管癌 1 . 病因可能是多种因素所致。(1)化学病因亚硝酸胺。(2)生物性病因真菌。(3)微量元素缺乏钼、铁、锌、氟、硒。(4)维生素缺乏VitA、VitB2、VitC。(5)不良饮食习惯(6)遗传因素具有遗传易感性。 2 . 病理发病年龄多在40岁以上，男多于女。好发部位为胸中段gt.上段。鳞癌最常见。 3 . 临床表现 早期无明显症状。典型的进行性吞咽困难是中晚期食管癌的表现。晚期可侵犯食管外组织出现各种症状。如侵犯喉返神经出现声音嘶哑；压迫颈交感神经产生Homer综合征；侵犯肝、脑出现黄疸、腹水、昏迷等。 4 . 诊断(1)食管吞稀钡x线双重对比造影对可疑病例，均应作此检查。(2)食管拉网脱落细胞检查对早期病变的阳性率达90%~95%，是一种简便易行的普查筛选方法。(3)食管镜检查 可在直视下取活组织行病理检查。(4)超声内镜检查(EUS)可用于判断食管癌的浸润层次、向外扩展深度以及有无纵隔、淋巴结或腹内脏器转移等。 5 . 治疗包括外科手术、放疗、化疗和综合治疗。手术是治疗食管癌的首选方法，根治性手术时切除食管的长度应在距肿瘤上、下5~8cm以上。 腐蚀性食管灼伤 1 . 病因 多为误服强酸或强碱等化学腐蚀剂引起食管化学性灼伤。也有因长期反流性食管炎、长期进食浓醋或长期服用酸性药物引起。强碱产生较严重的溶解性坏死；强酸产生蛋白质凝固性坏死。 2 . 病理根据灼伤的病理程度，一般分为三度。(1) 度灼伤 食管粘膜表浅充血水肿，7~8天后愈合，不遗留瘢痕。(2) 度灼伤

累及食管肌层。3~6周发生肉芽组织增生修复，遗留瘢痕，易导致食管狭窄。(3) 度灼伤 食管全层及周围组织凝固性坏死，可导致食管穿孔和纵隔炎。

### 3. 临床表现

误服腐蚀剂后，立即出现唇、口腔、咽部、胸骨后及上腹剧烈疼痛，随即反射性呕吐，呕吐物常带血性。此外，还可出现咳嗽、声音嘶哑、呼吸困难等。后期可引起食管狭窄。

### 4. 诊断病史

症状可确诊。必要时可进行食管碘油造影、食管x线造影。

### 5. 治疗

(1) 急诊处理 保持呼吸道通畅。 尽早吞服植物油或蛋白水，以保护食管和胃粘膜。 积极处理并发症。 防止食管狭窄，早期使用糖皮质激素和抗生素。

(2) 扩张疗法宜在伤后2~3周后进行。

(3) 手术疗法对严重长段狭窄及扩张疗法失败者，可采用手术治疗。

## 原发性纵隔肿瘤

### 1. 纵隔临床分区

纵隔是一个间隙，前为胸骨，后为胸椎，两侧为纵隔胸膜，上连颈部，下止于膈肌。以胸骨角与第4胸椎下缘的水平线为界，将纵隔分为上、下两部。在气管、心包前面的间隙为前纵隔；在气管、心包后方的间隙为后纵隔；近年来将含有很多重要器官的纵隔称为内脏器官纵隔(以往称中纵隔)。

### 2. 常见的纵隔肿瘤

位于前纵隔最常见的肿瘤是畸胎瘤和皮样囊肿，位于前上纵隔最常见的肿瘤是胸腺瘤，位于后纵隔最常见的肿瘤是神经源性肿瘤。

### 部位

常见的纵隔肿瘤

部位	常见的纵隔肿瘤
前上纵隔	胸腺瘤、畸胎瘤、淋巴源性肿瘤、甲状腺肿瘤
前下纵隔	畸胎瘤、淋巴源性肿瘤、海绵状血管瘤、脂肪瘤
中纵隔(内脏器官纵隔)	淋巴源性肿瘤、心包囊肿、支气管囊肿
后上纵隔	神经源性肿瘤
后下纵隔	神经源性肿瘤、食管囊肿

### 3. 纵隔肿瘤的特点

良性多见(占75%)，恶性少见； 多生长缓慢，早期无明显症状和体征； 既可原发，也可继发。

### 4. 临床表现

与肿瘤大小、部位、生长方向和速度、质地、性质等有关。常见症状包括：(1)胸痛、胸闷(2)压迫症状压迫交感神经出现Homer综合征；压迫喉返神经出现声音嘶哑；压迫臂丛出现上肢麻木；压迫无名静脉出现单侧上肢及颈静脉压增高；压迫上腔静脉出现颈静脉怒张；压迫食管出现吞咽困难等。(3)特异性癌状畸胎瘤破裂入肺内可咯出皮脂样分泌物；胸腺瘤可伴重症肌无力。

5. 诊断 胸部X线检查是诊断纵隔肿瘤的重要手段。断层摄片、CT、MRI能更进一步显示肿瘤与邻近组织器官的关系。其他辅助检查方法有超声扫描、核素检查、颈淋巴结活检、气管镜、食管镜、纵隔镜等检查。

6. 治疗原则 绝大多数纵隔肿瘤，一经确诊，如无禁忌，均应手术治疗；恶性肿瘤无法切除者，可给予放疗或化疗；恶性淋巴源性肿瘤对放疗敏感，首选放疗，不宜手术治疗。

最新热点资讯：百考试题第一时间公布09考研调剂信息 2009各地考研成绩查询信息汇总专题 编辑特别推荐：2009年研究生考试复试资料大汇总 考研政治基础辅导常考知识点精选汇总 09考研英语冲刺阅读理解专项训练汇总 考研冲刺：考研政治理论辅导资料汇总 更多优质信息请访问：百考试题考研站 百考试题论坛 丰富、优质考试试题请进入：百考试题在线考试中心 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)