

中药炮制棕榈炮制药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/547/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E7_82_AE_E5_c23_547551.htm 「来源」本品为棕榈科植物棕榈 *Trachycarpus H.wendl.* 的干燥叶鞘纤维（棕毛）及叶柄。「炮制方法」一、净制 除去杂质，洗净，干燥（《药典85》）。二、炮炙 1.制炭（1）煨炭 取净棕板，置煨锅内，密封，焖煨至透，放凉，取出（《药典85》）。（2）炒炭 取棕板切成斜块，置锅内用武火炒至外呈炭黑色，内呈焦黑色为度，喷淋清水适量，灭尽火星，取出，晾1夜（《河北》）。2.酒制 取棕榈块，以陈酒喷匀，炒成黑炭为度；取出放缸内严闭（不能透气，否则变成灰白色），焖1-2天取出即可（《集成》）。3.皂角制 取棕榈，洗净，用皂角水烫洗后，再用清水透洗2次，晒干，切段，放入煨锅内，上盖一小锅，两锅接合考试，大收集整理处用泥封固，以武火煨1小时，冷后取出。每净棕榈500kg，用皂角15kg，煎水适量，去渣（《湖北》）。「现代研究」1.比较研究了棕板与棕毛、新棕与陈棕、生棕榈与棕榈炭的止血作用。对比结果表明，棕榈的主要药用部位应为棕皮。棕榈药用当以陈者为良。棕榈应以煨炭入药为宜（叶定江等：中药通报，（2）：23，1983）。2.作了生棕榈、炒不同程度棕榈炭、焖煨棕榈炭的成分预试、薄层层析、鞣质含量、凝血止血作用比较。研究结果表明，棕榈入药皆要求制炭存性，存性程度越小，原药损耗越大，成分损失越多，止血效果越差。以炒轻棕榈炭为佳，原药损耗最低，成分破坏最少，止血效果较好。棕榈焖煨炭后，其成分基本损失殆尽，也未显示出止血作用。认为棕榈

以炒轻炭入药为宜（王琦等：中成药研究，（9：28，1983）
。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com