

考研复习指导之考研西医外科学辅导051考研 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/551/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E7\\_A0\\_94\\_E5\\_A4\\_8D\\_E4\\_c73\\_551149.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/551/2021_2022__E8_80_83_E7_A0_94_E5_A4_8D_E4_c73_551149.htm)

先天性斜颈 先天性斜颈

是一侧胸锁乳突肌纤维性痉挛，颈部和头面部向患侧偏斜的畸形。

1. 病因多为臀位产、产伤及牵拉等因素，导致患儿

一侧胸锁乳突肌损伤出血、血肿机化、挛缩所致；还有子宫内、外感染、遗传、动静脉栓塞而致肌肉坏死等。

2. 临床表现 (1) 婴儿出生后，一侧胸锁乳突肌即有肿块，不易辨认。

(2) 10天~2周，肿块变硬，不活动，呈梭形。

(3) 5个月~8个月，肿块逐渐消退，胸锁乳突肌纤维性萎缩、变短，牵拉枕部并偏向患侧，下颌转向健侧肩部，面部健侧饱满，患侧变小。

(4) 1岁左右，斜颈畸形可变明显，头向一侧倾斜，下颌转向健侧。

(5) 畸形随年龄增长而加重，脸部发育不对称，脊柱侧凸，头部活动受限。

3. 治疗 (1) 手法矫正治疗适用于gt.1岁的患儿。手术方法为胸锁乳突肌切断。术后头放矫正位，头颈胸石膏固定

先天性髋关节脱位 其病因未明。女多于男，约6:1。左侧比右侧多1倍，双侧者少见

先髋站立前期 先髋脱位期 临床表现 婴幼儿症状不明显 患肢缩短、活动受限 髋关节屈曲状、不能伸直 会阴部增宽、患侧皮皱加深增多 牵拉患肢，有弹响声或弹响感 开始行走时间较正常小儿晚 单侧髋脱患儿跛行 双侧髋脱臀部后耸、腰部前凸、鸭行步态 体格检查 髋关节屈曲外展试验 Galeazzi征或Allis征阳性 Ortolani试验阳性：诊断为先髋 Barlow试验阳性：诊断为不稳定髋 弹进弹出试验不适合gt.4岁 salfer骨盆截骨术或加股骨旋转截骨术 成年男性 chiari骨盆内移截骨术 最新热点资讯：百考

试题第一时间公布09考研调剂信息 2009各地考研成绩查询信息  
信息汇总专题 编辑特别推荐加入收藏：2009年研究生考试复试  
资料大汇总 考研政治基础辅导常考知识点精选汇总 09考研英语  
冲刺阅读理解专项训练汇总 考研冲刺：考研政治理论辅导  
资料汇总 更多优质信息请访问：百考试题考研站 百考试题论  
坛 丰富、优质考试试题请进入：百考试题在线考试中心  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)