

药物分析 氯羟四环素药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/552/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_552748.htm 其他名称：氯羟甲基四环素 性状：胶囊。 功能主治：临床上常用于治疗泌尿道感染、泌尿外科感染、呼吸道感染、痤疮等。 用法及用量：口服：0.17g / 次，4次 / 日。小儿每日12mg / kg，分4次。严重者剂量可加倍。 不良反应和注意：在一般剂量下毒性低，口服可有厌食、恶心、呕吐、腹痛，腹泻等胃肠道反应，大剂量长期口服可损害肝脏，引起二重感染，小儿牙齿变棕色（与牙齿的磷酸钙形成稳定的络合物）、骨生长缓慢等。偶有过敏反应，如药热、荨麻疹、嗜酸性白细胞增多等。注射时局部刺激剧烈，可致畸胎或死胎。静注易引起疼痛与血栓性静脉炎，故尽量采用静滴。静滴时，不要与其他抗生素、氢化可的松、钙盐等配伍。 其它：肾功能减退患者、孕妇、乳母及8岁以下小儿忌用。 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com