

药物分析 硫酸茚地那韦药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/552/2021\\_2022\\_E8\\_8D\\_AF\\_E7\\_89\\_A9\\_E5\\_88\\_86\\_E6\\_c23\\_552759.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/552/2021_2022_E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_552759.htm) 其他名称：佳息患  
主要成分：性状：胶囊。功能主治：成人HIV - I感染。可与抗  
逆转录病制剂（如：核苷和非核苷类逆转录酶抑制剂）合用  
治疗成人的HIV - I感染。单独应用治疗临幊上不适宜用核苷  
或非核苷类逆转录酶抑制剂治疗的成年患者。用法及用量：  
推荐的开始剂量为800mg，每8小时口服1次。与利福布汀联合  
治疗建议将利福布汀的剂量减半，而本药剂量增加至每8小  
时1g.与酮康唑合用本药的剂量应减少至每8小时600mg.肝功能  
不全患者剂量应减至每8小时600mg.不良反应和注意：可见虚  
弱 / 疲劳、眩晕、头痛、感觉迟钝、失眠、味觉异常；胃肠  
道反应；皮肤干燥、瘙痒、药疹等皮肤过敏反应；肾结石；  
肝、肾功能异常；血友病患者的自发出血增加；急性溶血性  
贫血；血糖升高或者糖尿病加重。血清甘油三酯增高。规格  
：胶囊200mgx180粒。400mgx90粒。其它：患者应注意摄取  
足够的水量。如果出现肾结石的症状和体征，可考虑暂停或  
中断治疗。如发生急性溶血性贫血，应实施相应的治疗，包  
括中断使用本药。肝功能不全患者、妊娠及哺乳妇女慎用。  
儿童禁用。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百  
考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐  
：2009年药师资格考试报名时间汇总 "#F8F8F8" 100Test 下载频  
道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com