

欧可芬（五官科用药）药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E6_AC_A7_E5_8F_AF_E8_8A_AC_EF_c23_553066.htm 主要成分：氟比洛芬钠。性状：水溶液。功能主治：用于抑制内眼手术时的瞳孔缩小及其术后抗炎，治疗镭射小梁成形术后的炎症反应和其他眼前段的炎症反应，预防及治疗1日术后的黄斑囊样水肿（CME）。用法及用量：1.用于抑制内眼手术时瞳孔缩小，术前2小时开始滴眼，每小时点1滴，共4次。2.一般抗炎及术后抗炎；每4小时1滴点眼，维持2～3周。3.镭射之梁成形术后，每4小时滴入结膜囊，用1周，其他手术用2～3周。其它：1.单纯疱疹病毒性角膜炎和对该药成分过敏者禁用。2.该药可能与乙酰水杨酸制剂及其它非类固醇类抗炎药存在交叉过敏，故对上述药物过敏病人慎用。急性眼部感染疾病在局部使用抗炎药物时，病情可能被掩盖，必须注意。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com