

那诺芬（降血压药）药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E9_82_A3_E8_AF_BA_E8_8A_AC_EF_c23_553068.htm 性状：片剂，针剂。 功能主治：用于轻、中度高血压的治疗。 用法及用量：口服：每次100～200mg，每日2～3次，3～4周为1疗程。皮下或肌注：每次20～50mg，每日2～3次，疗程同口服。 不良反应和注意：不良反应较多而严重，可有口干、心悸、体位性低血压、虚弱和疲倦、视力模糊、眩晕、便秘、尿潴留、食欲不振、恶心、呕吐、性机能障碍、肠麻痹、眼内压升高等。 规格：片剂：50mg、100mg；针剂：20mg、50mg. 其它：严重心肌损害、肾功能减退、脑血管硬化、冠状动脉硬化、青光眼及习惯性便秘、尿毒症患者忌用。 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总"100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com