

药物分析 美多洛尔药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_553953.htm

其他名称：倍他乐克
甲氧乙心美多心安美托洛尔
性状：片剂，针剂。功能主治：临床用于治疗各型高血压（可与利尿药和血管扩张剂合用）及心绞痛。本品静注对心律失常特别是室上性心律失常也有效。用法及用量：1.口服：因个体差异较大，故剂量需个体化。一般情况下，用于高血压病，开始时每日1次100mg，维持量为每日1次100～200mg，必要时增至每日400mg，早晚分服。用于心绞痛，每日100～150mg，分2～3次服，必要时可增至每日150～300mg。2.静注：用于心律失常，开始时5mg（每分钟1～2mg），隔5分钟重复注射，直至生效，一般总量为10～15mg。不良反应和注意：1.偶有胃部不适、眩晕、头痛、疲倦、失眠、恶梦等不良反应。2.哮喘病人不宜应用大剂量，应用一般剂量时也应分为3～4次服。3.心动过缓、糖尿病、甲亢患者及孕妇慎用。4.、度房室传导阻滞、严重心动过缓及对洋地黄无效的心衰病人忌用。5.肝、肾功能不良者慎用。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：[2009年药师资格考试报名时间汇总](#)"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com