

麻黄碱（平喘药）药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E9_BA_BB_E9_BB_84_E7_A2_B1_EF_c23_553955.htm

其他名称：麻黄素盐酸麻黄素左旋麻黄素 性状：常用其盐酸盐，为白色针状结晶或结晶性粉末；无臭，味苦。在水中易溶，在乙醇中溶解，在氯仿或乙醚中不溶。熔点217-220。片剂，注射液，滴眼剂，滴鼻剂。 功能主治：1.用于预防支气管哮喘发作和缓解轻度哮喘发作，对急性重度哮喘发作疗效不佳。2.用于蛛网膜下腔麻醉或硬膜外麻醉引起的低血压及慢性低血压症。3.治疗各种原因引起的鼻粘膜充血、肿胀引起的鼻塞。 用法及用量：1.支气管哮喘：口服：成人每次25mg，1日3次；儿童每千克体重每次0.5~1mg，1日3次。皮注或肌注：成人每次15~30mg.极量为1次60mg（口服）、50mg（注射）；1日150mg（口服）、120mg（注射）。2.蛛网膜下腔麻醉或硬膜外麻醉时维持血压，麻醉前皮注或肌注20~50mg.慢性低血压症，每次口服20~50mg，1日2次或3次。3.解除鼻粘膜充血、水肿，以0.5%~1%溶液滴鼻。每日3次，每次2~3滴。 不良反应和注意：1.大量长期使用，可引起震颤、焦虑、失眠、头痛、心悸、发热、出汗等不良反应。晚间服时，常加服镇静催眠药，如苯巴比妥以防失眠。2.短期反复使用可致快速耐受现象，作用减弱。停药数小时可恢复。 规格：片剂：每片15mg；25mg；30mg.注射液：每支30mg（1ml）；50mg（1ml）。滴眼剂：1%.滴鼻剂：0.5%-1%.其它：1.甲状腺功能亢进、高血压、动脉硬化、心绞痛等病人忌用。2.忌与优降甾等单胺氧化酶抑制剂合用，以免引起血压过高。3.偶有

病人对麻黄碱发生变态反应，前列腺肥大的男性可能会发生尿潴留。4.萎缩性鼻炎禁用。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com