

地塞米松（肾上腺皮质激素及促肾上腺）药师资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/554/2021_2022__E5_9C_B0_E5_A1_9E_E7_B1_B3_E6_c23_554813.htm 其他名称：德沙美松
氟甲强的松龙氟甲去氢氢化可的松氟美松甲氟烯索
主要成分：地塞米松。性状：片剂，注射液。功能主治：因抗炎作用较强，故用于抗炎。由于其盐皮质激素活性很弱，故不适用于原发性肾上腺皮质功能不全病人。用法及用量：1.口服：1日0.75～6mg，分2～4次服用。维持剂量1日0.5～0.75mg。2.肌注（地塞米松醋酸酯注射液），1次8～16mg，间隔2～3周1次。3.静滴（地塞米松磷酸钠注射液），每次2～20mg，或遵医嘱。不良反应和注意：1.较大剂量服用，易引起糖尿及类柯兴综合症。2.长期服用，较易引起精神症状及精神病，有忆病史及精神病史者最好不用。其它：溃疡病、血栓性静脉炎、活动性肺结核、肠吻合术后病人忌用或慎用。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com