

硫酸小诺霉素注射液的注意事项药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/554/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E5_B0_8F_E8_c23_554818.htm

1.肾功能不全、肝功能异常、前庭功能或听力减退者、失水、重症肌无力或帕金森病及老年患者慎用。 2.用药时间一般不宜超过14日，若必须继续用药时，应对听觉器官和肾功能进行严密监护。 3.交叉过敏，对一种氨基糖苷类抗生素如链霉素、庆大霉素过敏的患者，可能对硫酸小诺霉素注射液过敏。 4.有条件时疗程中应监测血药浓度，并据此调整剂量，不能测定血药浓度时，应根据测得的肌酐清除率调整剂量，尤其对肾功能减退者、早产儿、新生儿、婴幼儿或老年患者、休克、心力衰竭、腹水或严重失水等患者。 5.硫酸小诺霉素注射液一般只供肌肉内注射；稀释后可静脉滴注；但不能静脉注射，以免产生神经肌肉阻滞和呼吸抑制作用。 6.长期应用硫酸小诺霉素注射液可能导致耐药菌过度生长。 7.应给患者补充足够的水分，以减少肾小管损害。 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com