

2010年MBA全国联考数学重点习题一MBA考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/554/2021_2022_2010_E5_B9_B4MBA_c70_554418.htm

1、设10件产品中有4件不合格品，从中任取两件，已知取出的两件中有一件不合格品，求另一件也是不合格品的概率。（0.2）【思路】在“已知取出的两件中有一件不合格品”的情况下，另一件有两种情况(1)是不合格品,即一件为合格品,一件为不合格品(2)为合格品,即两件都是合格品.对于(1), $C(1,4) \cdot C(1,6) / C(2,10) = 8/15$.对

于(2), $C(2,4) / C(2,10) = 2/15$.提问实际上是求在这两种情况下,(1)的概率,则 $(2/15) / (8/15 + 2/15) = 1/5$ 2、设A是3阶矩阵， b_1, b_2, b_3 是线性无关的3维向量组，已

知 $Ab_1 = b_1, Ab_2 = -b_2, Ab_3 = b_3$,求 $|A|$ （答案： $|A| = -8$ ）

【思路】 $A =$ （等式两边求行列式的值,因为 b_1, b_2, b_3 线性无关,所以其行列式的值不为零,等式两边正好约去,得-8）

3、某人自称能预见未来，作为对他的考验，将1枚硬币抛10次，每一次让他事先预言结果，10次中他说对7次，如果实际上他并不能预见未来，只是随便猜测，则他作出这样好的答案的概率是多少？答案为 $11/64$ 。【思路】原题说他是好的答案,即包括了7次,8次,9次,10次的概率.

即 $C(7,10)0.5^7 \times 0.5^3 + \dots + C(10,10)0.5^{10}$,即为 $11/64$.

4、成等比数列三个数的和为正常数K,求这三个数乘积的最小值【思路

】 $a/q, a, a \cdot q = k$ (k 为正整数) 由此求得 $a = k / (1/q + 1 + q)$ 所求式 $= a^3$,求最小值可见简化为求 a 的最小值. 对 a 求导,的驻点为 $q = 1, q = -1$.

其中 $q = -1$ 时 a 取极小值 $-k$,从而有所求最小值为 $a = -k^3$. (mba不要求证明最值) 5、掷五枚硬币，已知至少出现两个正面，则

正面恰好出现三个的概率。【思路】可以有两种方法：1.用古典概型样本点数为 $C(3, 5)$ ，样本总数为 $C(2, 5)C(3, 5)C(4, 5)C(5, 5)$ （也就是说正面朝上为2, 3, 4, 5个），相除就可以了；2.用条件概率在至少出现2个正面的前提下，正好三个的概率。至少2个正面向上的概率为 $13/16$ ， $P(AB)$ 的概率为 $5/16$ ，得 $5/13$ 假设事件A：至少出现两个正面；B：恰好出现三个正面。A和B满足贝努力独立试验概型，出现正面的概率 $p=1/2$

$P(A)=1-(1/2)^5-(C_5^1)*(1/2)*(1/2)^4=13/16$ A包含B

， $P(AB)=P(B)=(C_5^3)*(1/2)^3*(1/2)^2=5/16$ 所以

： $P(B|A)=P(AB)/P(A)=5/13$ 。 编辑特别推荐:加入收藏

2009MBA联考数学辅导专项练习汇总 MBA全国联考指导MBA管理练习题汇总 MBA联考管理案例分析题选编及答案汇总 最近视觉焦点：09年MBA重大改革春季班和秋季班将实现并轨 更多优质信息请访问：把百考试题MBA站加入收藏 百考试题MBA站 百考试题论坛 丰富、优质考试试题请进入：百考试题在线考试中心 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com