

丁卡因（局部麻醉药）药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/556/2021_2022__E4_B8_81_E5_8D_A1_E5_9B_A0_EF_c23_556158.htm 其他名称：阿尼辛本多卡因地卡因潘托卡因四卡因主要成分：性状：粉针剂、注射液。功能主治：麻醉效力比普罗卡因大10-15倍，毒性亦大10-20倍。用于粘膜表面麻醉、传导阻滞麻醉、硬膜外麻醉和蛛网膜下腔麻醉；也用于眼科表面麻醉，优点是不损伤角膜上皮，不升高眼内压。用法及用量：局部注射：阻滞麻醉用0.2%-0.3%溶液，极量为0.1g.硬膜外麻醉：用0.3%溶液，极量为0.1g.表面麻醉用0.5%-2%溶液。滴眼1-2小时1次。不良反应和注意：毒性大，不宜注入体内；大剂量时可抑制心脏传导系统及中枢神经系统。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总"100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com