

注射用两性霉素B的药物相互作用药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/556/2021_2022__E6_B3_A8_E5_B0_84_E7_94_A8_E4_c23_556159.htm 1.肾上腺皮质激素，此类药物在控制两性霉素B的药物不良反应时可合用，但一般不推荐两者同时应用，因可加重两性霉素B诱发的低钾血症。如需同用时则肾上腺皮质激素宜用最小剂量和最短疗程，并需监测患者的血钾浓度和心脏功能。 2.洋地黄苷，注射用两性霉素B所致的低钾血症可增强潜在的洋地黄毒性。两者同用时应严密监测血钾浓度和心脏功能。 3.氟胞嘧啶与两性霉素B具协同作用，但注射用两性霉素B可增加细胞对前者的摄取并损害其经肾排泄，从而增强氟胞嘧啶的毒性反应。 4.注射用两性霉素B与吡咯类抗真菌药如酮康唑、氟康唑、伊曲康唑等在体外具拮抗作用。 5.氨基糖苷类、抗肿瘤药物、卷曲霉素、多粘菌素类、万古霉素等肾毒性药物与注射用两性霉素B同用时可增强其肾毒性。 6.骨髓抑制剂、放射治疗等可加重患者贫血，与两性霉素B合用时宜减少其剂量。 7.注射用两性霉素B诱发的低钾血症可加强神经肌肉阻断药的作用，两者同用时需监测血钾浓度。 8.应用尿液碱化药可增强注射用两性霉素B的排泄，并防止或减少肾小管酸中毒发生的可能。 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总"##F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com