

2009年工商管理硕士MBA数学模拟试题一MBA考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/564/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c70_564050.htm

1、 设10件产品中有4件不合格品，从中任取两件，已知取出的两件中有一件不合格品，求另一件也是不合格品的概率。（0.2）【思路】在“已知取出的两件中有一件不合格品”的情况下，另一件有两种情况(1)是不合格品,即一件为合格品,一件为不合格品(2)为合格品,即两件都是合格品.对于(1), $C(1,4) \cdot C(1,6) / C(2,10) = 8/15$.对

于(2), $C(2,4) / C(2,10) = 2/15$.提问实际上是求在这两种情况下,(1)的概率,则 $(2/15) / (8/15 + 2/15) = 1/5$

2、 设A是3阶矩阵， b_1, b_2, b_3 是线性无关的3维向量组，已知 $Ab_1 = b_1 + b_2$, $Ab_2 = -b_1 + 2b_2 - b_3$, $Ab_3 = b_2 - 3b_3$, 求 $|A|$ （答案： $|A| = -8$ ）【思路】 $A =$ （等式两边

求行列式的值,因为 b_1, b_2, b_3 线性无关,所以其行列式的值不为零,等式两边正好约去,得-8）

3、 某人自称能预见未来，作为对他的考验，将1枚硬币抛10次，每一次让他事先预言结果，10次中他说对7次，如果实际上他并不能预见未来，只是随便猜测，则他作出这样好的答案的概率是多少？答案为 $11/64$ 。

【思路】原题说他是好的答案,即包括了7次,8次,9次,10次的概率. 即 $C(7,10)0.5^7 \times 0.5^3 + \dots + C(10,10)0.5^{10}$, 即为 $11/64$.

4、 成等比数列三个数的和为正常数K,求这三个数乘积的最小值

【思路】 $a/q, a, a \cdot q = k$ (k 为正整数) 由此求得 $a = k / (1/q + 1 + q)$ 所求式 $= a^3$, 求最小值可见简化为求 a 的最小值. 对 a 求导, 的驻点为 $q = 1, q = -1$. 其中 $q = -1$ 时 a 取极小值 $-k$, 从而有所求最小值

为 $a = -k^3$. (mba不要求证明最值) 5、 掷五枚硬币，已知至少出现两个正面，则正面恰好出现三个的概率。【思路】可以有

两种方法：1.用古典概型 样本点数为 $C(3, 5)$ ，样本总数为 $C(2, 5) + C(3, 5) + C(4, 5) + C(5, 5)$ （也就是说正面朝上为2, 3, 4, 5个），相除就可以了；2.用条件概率 在至少出现2个正面的前提下，正好三个的概率。至少2个正面向上的概率为 $13/16$ ， $P(AB)$ 的概率为 $5/16$ ，得 $5/13$ 假设事件A：至少出现两个正面；B：恰好出现三个正面。A和B满足贝努力独立试验概型，出现正面的概率 $p=1/2$

$P(A)=1-(1/2)^5-(C_5^1)(1/2)*(1/2)^4=13/16$ A包含B

， $P(AB)=P(B)=(C_5^3)*(1/2)^3*(1/2)^2=5/16$ 所以

： $P(B|A)=P(AB)/P(A)=5/13$ 1、设10件产品中有4件不合格品，从中任取两件，已知取出的两件中有一件不合格品，求另一件也是不合格品的概率。（0.2）【思路】在“已知取出的两件中有一件不合格品”的情况下，另一件有两种情况(1)是不合格品,即一件为合格品,一件为不合格品(2)为合格品,即两件都是合格品.对于(1), $C(1,4)*C(1,6)/C(2,10)=8/15$.对

于(2), $C(2,4)/C(2,10)=2/15$.提问实际上是求在这两种情况下,(1)的概率,则 $(2/15)/(8/15+2/15)=1/5$ 2、设A是3阶矩阵， b_1, b_2, b_3 是线性无关的3维向量组，已知 $Ab_1=b_1+b_2$, $Ab_2=-b_1+2b_2-b_3$,

$Ab_3=b_2-3b_3$, 求 $|A|$ （答案： $|A|=-8$ ）【思路】 $A=$ （等式两边求行列式的值,因为 b_1, b_2, b_3 线性无关,所以其行列式的值不为零,等式两边正好约去,得-8） 3、某人自称能预见未来，作为对他的考验，将1枚硬币抛10次，每一次让他事先预言结果

，10次中他说对7次，如果实际上他并不能预见未来，只是随便猜测，则他作出这样好的答案的概率是多少？答案为 $11/64$ 。

【思路】原题说他是好的答案,即包括了7次,8次,9次,10次的概率. 即 $C(7, 10)0.5^7 \times 0.5^3 + \dots + C(10, 10)0.5^{10}$, 即为 $11/64$. 4、

成等比数列三个数的和为正常数K,求这三个数乘积的最小值

【思路】 $a/q \cdot a \cdot a \cdot q = k$ (k为正整数) 由此求得 $a = k/(1/q \cdot 1 \cdot q)$ 所求式 $= a^3$, 求最小值可见简化为求a的最小值. 对a求导, 的驻点为 $q = 1, q = -1$. 其中 $q = -1$ 时a取极小值-k, 从而有所求最小值为 $a = -k^3$. (mba不要求证明最值) 5、 掷五枚硬币, 已知至少出现两个正面, 则正面恰好出现三个的概率。 【思路】可以有两种方法: 1. 用古典概型 样本点数为 $C(3, 5)$, 样本总数为 $C(2, 5) + C(3, 5) + C(4, 5) + C(5, 5)$ (也就是说正面朝上为2, 3, 4, 5个), 相除就可以了; 2. 用条件概率 在至少出现2个正面的前提下, 正好三个的概率。至少2个正面向上的概率为 $13/16$, $P(AB)$ 的概率为 $5/16$, 得 $5/13$ 假设事件A: 至少出现两个正面; B: 恰好出现三个正面。 A和B满足贝努力独立试验概型, 出现正面的概率 $p = 1/2$

$P(A) = 1 - (1/2)^5 - (C_5^1) \cdot (1/2) \cdot (1/2)^4 = 13/16$ A包含B

, $P(AB) = P(B) = (C_5^3) \cdot (1/2)^3 \cdot (1/2)^2 = 5/16$ 所以

: $P(B|A) = P(AB)/P(A) = 5/13$ 编辑特别推荐加入收藏:

2009MBA联考数学辅导专项练习汇总 MBA全国联考指导MBA管理练习题汇总 MBA联考管理案例分析题选编及答案汇总 最近视觉焦点: 09年MBA重大改革春季班和秋季班将实现并轨 更多优质信息请访问: 百考试题MBA站 百考试题论坛 丰富、优质考试试题请进入: 百考试题在线考试中心 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com